

Комитет охраны природы и управления природопользованием
Нижегородской области
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
Экологический центр «ДронТ»



С.В. Бакка, Н.Ю. Киселева, Л.М. Новикова

***Ключевые орнитологические
территории
Нижегородской области***

Нижний Новгород
2004



С.В.Бакка, Н.Ю.Киселева, Л.М.Новикова. Ключевые орнитологические территории Нижегородской области. Методическое пособие. Н.Новгород: Международный Социально-экологический Союз, Экоцентр «Дронт», 2004. 95 с.

Каталог содержит сведения обо всех выделенных к настоящему моменту ключевых орнитологических территориях Нижегородской области, рассказывает, для каких птиц они важны, что угрожает этим территориям, что уже сделано и что нужно сделать для их сохранения. Книга содержит систему критериев, пользуясь которыми каждый интересующийся птицами человек может определить орнитологическое значение того места, где он живет. Авторы надеются, что эта книга поможет увеличить число любителей птиц и сохранить богатую природу Нижегородского Поволжья.

Оригинал-макет - Н.Ю.Киселева, Л.М.Новикова

Рис. на обложке - С.В.Бакка

Издание осуществлено при поддержке Комитета охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области за счет средств областного экологического фонда Нижегородской области.

Изд. лиц. ИД № 002271 от 12.10.1999, Международный Социально-экологический Союз
ISBN 5-88587-255-4



© Экологический центр "Дронт", 2004

© С.В.Бакка, Н.Ю.Киселева, Л.М.Новикова, 2004

Введение

У птиц, как и у людей, есть любимые места. Здесь им особенно хорошо, и потому они в большом количестве выводят птенцов, скапливаются во время миграций, зимуют... Такие места специалисты называют ключевыми орнитологическими территориями.

Есть они и в нашей области. Это - лучшие уголки нашей природы. Участвуя в их сохранении, Вы оставляете детям и внукам шанс жить в гармоничном мире ярких красок и песен наших пернатых соседей по планете.

В этой книге Вы найдете сведения обо всех ключевых орнитологических территориях нашей области, узнаете, для каких птиц они важны, что им угрожает, что уже сделано и что еще нужно сделать для их сохранения. Мы уверены, что выделение важных для птиц территорий в нашей области еще не закончено. Книга содержит несложную систему критериев, пользуясь которыми, можно определить значение для птиц тех мест, где Вы живете.

Более подробное изучение уже выделенных территорий часто меняет представление об их важности. Несколько территорий, первоначально считавшихся важными на областном уровне, впоследствии получили статус международных и даже всемирных!

Мы надеемся, что эта книга станет не только справочником для всех людей, интересующих родной природой, но и будет способствовать росту рядов любителей птиц и сохранению удивительно богатого живого мира Нижегородского Поволжья!

Краткая характеристика Нижегородской области

Нижегородская область расположена в центре Восточно-европейской равнины, в бассейне реки Волги и ее притоков, в лесной и лесостепной зонах. На ее территории происходит переход от пихтово-еловых, еловых, елово-широколиственных и широколиственных лесов к луговой степи. Нижегородское Поволжье, где сходятся несколько различных природных регионов, характеризуется повышенным биологическим разнообразием. По рельефу и типам ландшафтов наша область разделяется на две почти равные части: лесное низинное Заволжье (площадью 42 тыс. км²) и почти безлесное возвышенное Предволжье (около 35 тыс. км²). Максимальная высота над уровнем моря - 243 м (Мордовская возвышенность, междуречье р. Пьяна и р. Алатырь), минимальная - 63 м (долина р. Волги у р.п. Васильсурск). По территории области протекает 550 рек длиной более 10 км и 8650 речек и ручьев длиной менее 10 км; суммарная длина всех водотоков области составляет 33 тыс. км. В Нижегородской области 2700 озер, прудов и водохранилищ, площадь водного зеркала которых более 1 га, а их суммарная площадь составляет 9,8 тыс. км². Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура в Заволжье не превышает +2,3-+3°C, а на большей части Правобережья - +3,1 - +3,4°C. Средняя температура января - от -13,5°C на севере области до -11°C на юге, июля - от +17,5°C на севере области до +19°C на юге. Среднегодовое количество осадков от 610-560 мм на северо-западе до 500-430 мм на юго-востоке.

Площадь Нижегородской области 76,9 тыс. км², в ее состав входит 48 административных районов. Численность населения на начало 1996 года составляла 3 712 861 человек., из них -1,5 млн.человек - население г. Нижнего Новгорода. Распределено население неравномерно - около 2,5 млн. человек сосредоточено в Нижегородской агломерации. Средняя плотность населения составляет 48,5 чел./км², по районам области она варьирует от менее 5 чел./км² в Тоншаевском, Шахунском Ветлужском и Варнавинском районах до более 20 чел./км² в Вачском, Павловском, Богородском, Кстовском и Спасском районах. Плотность населения в г. Нижнем Новгороде - свыше 200 чел./км². В Нижегородской области расположены 27 городов, 70 поселков городского типа и 4600 сельских населенных пунктов.

Лесистость области составляет 47,4 %; земли населенных пунктов занимают 7,5 % территории области, земли промышленности, транспорта и связи - 2 %. Сельскохозяйственные земли составляют 45,5 % территории области.

Орнитологическая значимость Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрировано 293 вида птиц (Приложение 1), из которых когда-либо гнездились 204 вида (из них 194 регулярно гнездятся, 7 - нерегулярно гнездятся, 3 вида исчезли на гнездовании, 1 - вероятно исчез), вероятно гнездятся 4 вида птиц (включая один вид, вероятно исчезнувший на гнездовании). Только на пролете отмечено 30 видов, встречаются только зимой 8 видов, еще 48 видов отмечены в качестве залетных, в том числе залеты 38 видов случайные, 10 видов - регулярные.

В Красную книгу Нижегородской области занесено 70 видов. В Красную книгу заносились только те виды, для которых было установлено или предполагалось гнездование на территории области. Поэтому ряд видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ, не был включен в региональную Красную книгу. Среди них кречет, отмеченный в области в качестве нерегулярно пролетного вида и 14 залетных видов (розовый пеликан, обыкновенный фламинго, краснозобая казарка, мраморный чирок, мандаринка, белоглазый нырок, савка, черный гриф, балобан, стерх, ходулочник, шилоклювка, черноголовый хохотун, вертялая камышевка). Для семи видов (черношейная поганка, чомга, серая цапля, черная крачка, белокрылая крачка, речная крачка, серебристая чайка), занесенных в Красную книгу Нижегородской области, особой охране подлежат только ключевые местообитания.

Под наибольшей угрозой исчезновения в Нижегородской области находятся 16 видов птиц (Приложение 2). Для сохранения этих видов в фауне области требуются следующие меры: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение местообитаний и кормовой базы, а также снижение фактора беспокойства, пропаганда охраны редких видов, предотвращение прямого преследования, проведение биотехнических мероприятий (например, установка гнездовых платформ для хищных птиц), предотвращение роста применения пестицидов в сельском и лесном хозяйстве.

Основные местообитания, наиболее ценные для птиц на территории области:

- сохранившиеся участки высоковозрастных лесов (южнотаежные темнохвойные, хвойно-широколиственные, плакорные дубравы, сосновые боры, пойменные леса);
- крупные массивы верховых, переходных и низинных болот;
- водоемы выработанных торфяных месторождений, крупные пруды, мелководные участки водохранилищ;
- сохранившиеся участки луговых степей.

Основные факторы, угрожающие существованию птиц в Нижегородской области:

- разрушение местообитаний (в первую очередь - вырубка высоковозрастных лесов);
- браконьерство;
- возрастание фактора беспокойства.

Применение пестицидов в сельском и лесном хозяйстве являлось важнейшим фактором, представлявшим угрозу для многих видов птиц до конца 1980-х г.г., а в настоящее время большого значения не имеет.

Состояние охраны птиц

В области готовится к изданию Красная книга. Красная книга Нижегородской области учреждена постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 26.03.1996 г. № 62. Положение о Красной книге Нижегородской области утверждено распоряжением губернатора области от 13.05.1997 г. № 574-р. Перечень видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, утвержден распоряжением губернатора области от 22.07.1998 г. № 1153-р.

В настоящее время в Нижегородской области организованы 1 заповедник - Керженский (46,90 тыс. га), 18 заказников общей площадью 325,98 тыс. га (в том числе один орнитологический площадью 2,12 тыс. га, 9 охотничьих общей площадью 192,35 тыс. га и 8 комплексных площадью 131,51 тыс. га) и 394 памятника природы областного значения площадью 155,78 тыс. га. Кроме этого, в области существует 117 охранных зон ООПТ, занимающих 84,40 тыс. га. Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных территорий в Нижегородской области составляет 613,06 тыс. га (8 % всей площади области). Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 г. № 57-м утвержден перечень ООПТ, находящихся в стадии проектирования. Хозяйственная деятельность на этих территориях допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проведенной областным комитетом охраны окружающей среды. С учетом этих зарезервированных ООПТ их общая площадь составляет около 12 % территории области.

К настоящему времени в Нижегородской области выявлено большинство местообитаний птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Практически все выявленные местообитания птиц, нуждающихся в территориальной охране (к ним мы не относим кулика-сороку и малую крачку, гнездящихся на песчаных островах и берегах рек), находятся либо на утвержденных, либо на зарезервированных ООПТ. Существующая сеть ООПТ обеспечивает сохранение местообитаний наиболее редких видов птиц, что является необходимым условием для стабилизации их численности, хотя и на предельно низком уровне.

Кроме того, для 20 видов из числа занесенных в Красную книгу Нижегородской области (черношейная поганка, красношейная поганка, малая выпь, серая цапля, луток, длинноносый крохаль, орел-карлик, дербник, серый журавль, лысуха, фифи, серебристая чайка, глухая кукушка, сплюшка, бородатая неясыть, седой дятел, трехпалый дятел, мухоловка-белошейка, луговой конек, серый сорокопут) большинство местообитаний или наиболее важные местообитания находятся на утвержденных или зарезервированных ООПТ.

Местообитания еще 17 видов (большая поганка, кобчик, малый погоныш, мородунка, поручейник, малая чайка, черная крачка, белокрылая крачка, речная крачка, домовый сыч, ястребиная сова, клинтух, сизоворонка, обыкновенный зимородок, кукушка, обыкновенный ремез, обыкновенный сверчок) представлены на ООПТ разного ранга.

Территориальной формой охраны в виде ООПТ 8 видов (белый аист, лебедь-шипун, серая утка, турухтан, золотистая шурка, северная бормотушка, ястребиная славка, белая лазоревка) не обеспечены вовсе.

В настоящее время отсутствуют достоверные сведения о местах гнездования 5 видов птиц, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (серошекая поганка, черный аист, большой крохаль, пастушок, погоныш-крошка).

Под действенной охраной находится лишь территория Керженского заповедника, имеющего достаточный специальный штат охраны. Режим охраны ООПТ областного значения обеспечивает сохранение местообитаний редких видов птиц.

Программа «Ключевые орнитологические территории России»

Ключевые орнитологические территории – это наиболее ценные для птиц участки земной или водной поверхности, деградация которых резко отрицательно сказывается на благополучии отдельных популяций и видов птиц в целом. К таким территориям относятся, например, местообитания редких видов птиц, места колониального гнездования, линные, миграционные и зимовочные скопления. Идея выявления и сохранения наиболее ценных для птиц территорий легла в основу специальной международной природоохранной программы "Important Bird Areas (IBA)", которую осуществляет Международная ассоциация общественных организаций, охраняющих птиц – «BirdLife International». Стараясь сделать мир лучшим для птиц, BirdLife International способствует улучшению жизни людей. Людям и птицам необходимо одно и то же – здоровая окружающая среда, в которой освоение ресурсов происходит в соответствии с принципами устойчивого развития.

Программа IBA (Important Bird Areas – важные для птиц территории) – проект всемирного масштаба, направленный на выявление и охрану всех уголков, особо значимых для сохранения птиц на Земле. Всего в мире выделено около 20 тысяч таких территорий. Частью этого проекта, призванного обеспечить территориальной охраной птиц в глобальном масштабе, является российская программа «Ключевые орнитологические территории России» (КОТР). Программа КОТР, осуществляемая с 1994 года, стала ведущей в деятельности Союза охраны птиц России.

Цель программы – выявление и сохранение наиболее важных для птиц участков. Выделяют КОТР, имеющие международное, общероссийское и местное значение. К началу третьего тысячелетия в России было выделено свыше 700 КОТР, из которых более 500 имеют международное значение. Это – наследие XX века. Наша задача в XXI веке – его сохранить и приумножить!

В Нижегородской области выявлено 85 КОТР. Из них: международных (всемирных) – 14, международных (европейских) – 14, вероятно международных – 2, областных – 47, вероятно областных – 8 (рис. 1).

Суть программы «Ключевые орнитологические территории России» – добровольное участие в поиске и сохранении ценных для птиц участков всеми, кто считает это важным и нужным.

Основные задачи программы КОТР:

- 1) выявление и описание ключевых орнитологических территорий России;
- 2) организация охраны КОТР;
- 3) мониторинг состояния КОТР: контроль над сохранностью мест обитания и благополучием обитающих здесь видов;
- 4) принятие мер в случае угрозы КОТР и обитающим на них птицам;
- 5) пропаганда охраны птиц и их местообитаний;
- 6) подготовка и публикация каталогов КОТР для распространения информации о ключевых орнитологических территориях среди общественности, а также во властных и управленческих структурах.

Один из основных механизмов решения этих задач – создание групп общественной поддержки КОТР на местах. Программа изначально была ориентирована на объединение усилий орнитологов-профессионалов и любителей птиц. В Нижегородской области такое сотрудничество оказалось особенно удачным. Естественное стремление людей сохранить дорогие им уголки природы, помноженное на престиж личного участия в осуществлении международной программы по выявлению и сохранению КОТР стало надежным фундаментом для создания сети групп поддержки КОТР.

Данные, собранные членами групп поддержки КОТР, постоянно публикуются в ежеквартальном информационно-методическом бюллетене Нижегородского отделения СОПР «Люди и птицы», наряду со сведениями, собранными орнитологами-профессионалами, стали материалами этой книги.

Организация общественной поддержки ключевых орнитологических территорий (КОТР) в Нижегородской области

В подавляющем большинстве европейских стран, как и в России, создание региональных и национальных сетей хранителей КОТР только начинает разворачиваться. Опыт организации общественной поддержки КОТР в Нижегородской области признан одним из лучших в России. В области уже создано 65 групп общественной поддержки, под «опекой» которых находится 26 КОТР. Педагоги и школьники активно включились в реализацию программы. В первую очередь группы поддержки возникали у КОТР международного значения – Камско-Бакалдинской группы болот (школы Семеновского, Воскресенского, Воротынского и Лысковского районов), Ситниковских торфокарьеров (школы Борского района), торфокарьеров Володарского и Балахнинского районов (школы и Балахнинская станция юных туристов), Шумерлинской КОТР (школы Пильнинского, Сеченовского и Краснооктябрьских районов). Число групп поддержки КОТР постоянно множится. Но пока 59 ключевых орнитологических территорий области не имеют «общественных защитников»!

Общественная поддержка КОТР в нашем понимании – это разнообразная добровольная деятельность различных социальных сил и групп (населения, органов власти, производственных коллективов, средств массовой информации, социальных движений и т.п.) по сохранению ключевых местообитаний птиц. Такая поддержка может быть моральной, финансовой, материально-технической, информационной, организационной, юридической и пр. (Место под солнцем, 1998).




Рис. 1. Схема расположения ключевых орнитологических территорий Нижегородской области

Номера территорий на карте соответствуют их нумерации в тексте

Мотивация деятельности по охране птиц и их местообитаний базируется на двух началах - как культурно-эстетическом, нравственном, так и практическом, хозяйственном. У различных социальных групп такая мотивация может существенно различаться, основываясь на разных уровнях подхода и понимания проблемы территориальной охраны природы. Можно выделить различные виды групп поддержки, определить особенности их деятельности и наметить пути взаимодействия с ними (таблица 1).

Таблица 1

Основные виды групп поддержки КОТР в зависимости от уровня понимания проблемы территориальной охраны природы

Уровень подхода и понимания проблемы	Виды групп поддержки и особенности их деятельности	Перспективы сотрудничества
Традиционное поклонение природным объектам, основанное на системе представлений в и т.д., традиционное регламентирование традиционных и мировых религиях(в том числе запретов и рекомендаций)	Местные сообщества, осуществляющие так называемые народные формы охраны природы (бытование священных рощ, поклонение источникам определенных видов природопользования и др.). Как правило, это достаточно закрытые от внешних связей сообщества - компактно проживающие представители различных этносов и религиозных конфессий и т.д.	Представители этих сообществ обычно избегают контактов с «непосвященными». Возможно наладить с ними информационное взаимодействие при условии уважительного отношения к их системе взглядов.
Эмоционально-эстетический подход, основанный на глубоком восприятии красоты и ценности природных объектов	Как правило, отдельные энтузиасты охраны природы из местных сообществ, детские экологические объединения. Такие группы особое внимание уделяют агитационно-пропагандистской работе с населением.	Сотрудничество может быть весьма эффективным при оказании таким группам необходимой информационно-методической поддержки.
Рационально-ресурсный подход, основанный на понимании необходимости сохранения ресурсной базы традиционного природопользования.	Преимущественно охотничье-рыболовные общественные объединения, работники лесного и охотничьего хозяйства, движимые здоровым прагматизмом в отношении как сырьевых, так и рекреационных ресурсов. Территориальная охрана природы затрагивает жизненные интересы этих людей, делая их социально активными.	Эти группы могут оказать мощную общественную поддержку ООПТ и КОТР.
Научно-теоретический подход основанный на глубоком понимании всех аспектов проблемы территориальной охраны природы	Неправительственные природоохранные объединения, в составе которых работают специалисты, ведущие работы по развитию сетей ООПТ на высоком профессиональном уровне.	Необходима координация действий таких объединений, обмен информацией о разных аспектах природоохранной значимости территорий.

Предложенная нами классификация достаточно условна, поскольку в реальной жизни переплетение интересов значительно сложнее. Тем не менее, учет выявленных особенностей, на наш взгляд, поможет эффективнее организовать общественную поддержку КОТР.

Уровни активности конкретных групп заметно различаются - от тихого внутреннего протеста против разрушения природы и готовности поддержать привнесенные извне идеи до самостоятельных действий по созданию и обеспечению функционирования существующих ООПТ.

В Нижегородской области участниками программы КОТР стали люди, как профессионально связанные с природой - работники природоохранных структур, лесного и охотничьего хозяйства, так и любители природы разного возраста и профессий. Потребности людей, принадлежащих к разным социальным группам, могут быть удовлетворены в процессе реализации программы «Ключевые орнитологические территории России». Это могут быть как профессиональные потребности (получение информации либо об объектах профессиональной деятельности, либо используемой в основной работе; реализация природоохранных мероприятий), так и личные (удовлетворение познавательных и эстетических потребностей, социальная значимость участия в этой работе).

Очень высок потенциал работы педагогов. Во-первых, профессиональные интересы учителей во многом совпадают с интересами СОПР в деле реализации программы «Ключевые орнитологические территории России» - заинтересованность в краеведческом материале, методически проработанных мероприятиях, организуемых для школьников (День птиц, Всемирные дни наблюдений за птицами, акция «Птица года» и т.д.), возможность участия в решении экологических проблем на локальном уровне. Во-вторых, среди педагогов, независимо от их специализации, велико число любителей природы. В-третьих, эта профессиональная группа относительно многочисленна: в Нижегородской области работает около 100 охотоведов, около 200 лесничих и свыше 5000 учителей биологии и географии, педагогов дополнительного образования.

**Группы,
готовые к сотрудничеству по программе КОТР,
основанному на:**

**преимущественно совпадении
профессиональных интересов**

Работники природоохранных структур
Работники охотничьего хозяйства
Педагоги
Сотрудники музеев
Журналисты

**преимущественно реализации
личных интересов**

Любители и знатоки природы
Охотники-любители
Работники лесного хозяйства
Работники сельского хозяйства
Школьники
Административные работники

Нижегородское отделение СОПР для вовлечения населения в программу КОТР основным механизмом избрало сбор орнитологической информации. Принципиальная схема этой деятельности такова:



Формы участия в движении хранителей КОТР разнообразны, и каждый человек может найти себе интересное и посильное дело.

/. Агитационно-пропагандистская работа, информирование населения о программе КОТР. Члены групп поддержки КОТР могут рассказывать в средствах массовой информации о ключевых орнитологических территориях, их ценности, связанных с ними проблемах, возможностях участия населения в решении этих проблем. Можно устанавливать информационные знаки, аншлаги, вести разъяснительную работу с населением, сотрудничать с сотрудниками краеведческих музеев, совместно подготавливая экспозиции, посвященные КОТР района. Важной частью такой работы может стать художественное творчество, создание предметов декоративно-прикладного искусства, демонстрирующих красоту мира птиц и окружающей их природы.

2. Проведение орнитофенологических наблюдений. Опыт отечественной науки по использованию корреспондентских сетей насчитывает не менее полутора столетий, и начинался этот опыт со сбора орнитофенологической информации. Академик А.Ф.Миддендорф в своей работе использовал наблюдения за миграциями птиц, проводимых массовой сетью его добровольных корреспондентов по всей России. В дальнейшем подобные исследования организовывал профессор Д.Н.Кайгородов. Сбор орнитофенологических данных актуален постоянно, доступен широкому кругу людей, в том числе для проживающих на ключевых орнитологических территориях.

Значение таких данных очень велико. Например, только благодаря самоотверженному труду Н.А.Платунова из п. Сява Шахунского района, который с 1956 по 1982 год аккуратно отправлял в Русское географическое общество анкеты с материалами фенологических наблюдений, у орнитологов есть материалы о сроках прилета и отлета некоторых птиц на севере нашей области за 26 лет! Многолетние данные наших корреспондентов постоянно публикуются в информационно-методическом бюллетене Нижегородского отделения СОПР «Люди и птицы». Эти данные позволяют видеть такие важные процессы, как, например, последствия глобального потепления климата.

3. Поиск редких видов птиц и сбор информации для кадастра животного мира осуществляется на основе различных методик – анкетирования, опросов местного населения, проведения районных конкурсов исследовательских и творческих работ по изучению и охране биоразнообразия. Эта деятельность дает людям возможность совершать небольшие открытия. История многих ключевых орнитологических территорий, в том числе всемирного значения, начиналась с рассказов местных жителей о встречах с редкими птицами.

4. Изучение пролета. Эта деятельность в упрощенном варианте доступна широким слоям населения. В силу достаточной простоты методики и массового материала изучение пролета может стать темой школьных исследовательских работ. Все желающие могут получить в Нижегородском отделении Союза охраны птиц России «Методические рекомендации по проведению наблюдений за пролетом птиц». С 2000 года ежегодно в Нижегородской области не менее 150 человек собирают информацию, характеризующую сроки и интенсивность весеннего пролета птиц.

5. Участие в акциях Союза охраны птиц России («Птица года», «Всемирные дни наблюдений птиц» и др.) для многих людей становится первым шагом в любительскую орнитологию. Немаловажную роль в этом играют как необязательность профессиональных знаний и навыков, так и престиж участия в международной или всероссийской акции.

6. Проведение биотехнических мероприятий (подкормка, создание убежищ, развешивание искусственных гнездовий). Это – традиционные формы помощи птицам, доступные для всех. А помощь птицам года в решении жилищной проблемы на КОТР имеет особое значение, повышая значимость таких территорий.

7. Экологические субботники на ключевых орнитологических территориях должны быть направлены на ликвидацию последствий деятельности человека – уборку мусора, тушение начинающихся пожаров и их профилактику (устройство оборудованных кострищ, мест для стоянок туристов, охотников, рыболовов) и пр. При организации таких субботников не стоит планировать уборку дуплистых деревьев, сухостоя и валежника, служащих убежищами для многих редких видов.

8. Информирование работников природоохранных структур о возникновении угроз для ключевых орнитологических территорий, усиленное участие в профилактике таких угроз.

По результатам ежегодного мониторинга КОТР следует оформлять специальную карточку (Приложение 3).

Наиболее результативной формой взаимодействия мы считаем совместные работы любителей на местах и орнитологов-профессионалов, в первую очередь полевые тренинги (обследование территорий; контроль за состоянием и соблюдением режимов охраны ООПТ; учеты птиц; проведение биотехнических мероприятий).

С помощью участников групп поддержки КОТР найдены неизвестные ранее гнезда орлана-белохвоста, белого аиста и других видов птиц, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, выявлены новые предотлетные скопления серых журавлей, уточнена их численность в местах известных скоплений, собраны сведения, изменившие представления о весеннем пролете в Нижегородской области.

О правильности и действенности организации работы свидетельствует тот факт, что возникшие группы поддержки берут на себя дальнейшую работу с местным населением, иницируют расширение корреспондентской сети. Так, например, директор Петряксинской средней школы К.А. Билялова стала организатором работы по программе КОТР среди коллег – учителей биологии Пильнинского района. Э.Э. Шарапова, руководитель кружка «Юный орнитолог» станции юных натуралистов г. Саров, привлекает к ежегодным наблюдениям за предотлетным скоплением серых журавлей в Вознесенском районе местных школьников. Скаутский отряд «Биос» под руководством И.Н. Коротаева (Больше-Иевлевская школа Воскресенского района) стал инициатором ежеквартального выпуска эколого-краеведческого приложения «Ласточка» к районной газете «Воскресенская жизнь». Число таких примеров постоянно множится.

Оставим птицам место рядом с нами!

Критерии выделения КОТР

Ключевые орнитологические территории выделяются на основании специальных критериев, разработанных координационным центром программы КОТР в соответствии с требованиями Международной ассоциации охраны птиц (BirdLife International). Первоочередное внимание уделено редким, сокращающим численность или образующим крупные скопления (и, следовательно, уязвимым) видам птиц. В основе большинства критериев – четкие количественные пороги численности (табл. 2, 3). Значимой для вида или популяции принято считать потерю 1 % численности. Эта величина и использовалась при расчете большинства порогов численности, на которых основано выделение КОТР. Ключевая орнитологическая территория имеет тот или иной ранг, если выполняется хотя бы один из перечисленных ниже критериев. Надежность оценки ранга КОТР повышается, если выполняется сразу несколько критериев.

А. Ключевые орнитологические территории всемирного значения

Категория А1: на выделяемой территории регулярно обитает значительное число особей одного или нескольких видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения, а также тех, которые могут в будущем попасть в эту категорию.

При использовании критерия следует исключать случаи залетов, древние исторические факты и т.п. Понятие «регулярно обитает» включает и сезонное присутствие, например, регулярные остановки на пролете. Пороги численности приведены в колонке 3 таблицы 2 и колонке 3 таблицы 3.

Категория А2: касается эндемичных видов, которых в Нижегородской области нет.

Категория А3: известно или предполагается, что на выделяемой территории обитает значительное количество видов, распространение которых ограничено одним биомом.

Эта категория применяется к видам, площадь ареала которых более 50000 км², и которые встречаются преимущественно в пределах какого-либо одного биома. **Биом** в данном случае определяется как большое региональное экологическое сообщество, характеризующееся определенными видами животных и характерными видами растений. На территории Нижегородской области возможно выделение КОТР только для видов, встречающихся преимущественно в пределах **тайги** - одного из биомов согласно классификации, разработанной BirdLife International. Соответствующими данному критерию считаются территории, на которых обитает не менее 5 видов из следующего списка:

1. Красношейная поганка	9	Пеночка-таловка*
2. Луток		10 Сероголовая гаичка*
3. Большой улит	11.	Вьюрок
4. Гаршнеп*	12	Щур*
5. Ястребиная сова	13	Клест-сосновик*
6. Бородатая неясыть	14	Белокрылый клест*
7. Кукушка		15 Овсянка-ремез
8. Свиристель*		

* - виды, не гнездящиеся в Нижегородской области, оставлены в списке для сведения и использования при выделении КОТР в регионах, сопредельных с Нижегородской областью.

Выявление КОТР данной категории целесообразно начинать с поиска обширной территории с сохранившимися местообитаниями. В пределах таежного биома в крупных массивах старовозрастных хвойных лесов и сфагновых болот с высокой вероятностью обитает достаточное число видов из приведенного списка.

Категория А4. Территория может быть выделена по одному из следующих критериев:

А4.1 - известно или предполагается, что на выделяемой территории обитает (постоянно или временно) не менее 1 % европейской популяции водоплавающих и околоводных птиц, образующих скопления (колонка 4 в таблице 2 и колонка 4 в таблице 3);

А4.2 - относится к морским птицам, отсутствующим в Нижегородской области;

А4.3 - известно или предполагается, что на выделяемой территории держится более 20.000 водоплавающих и околоводных птиц одного или нескольких видов;

А4.4 - известно или предполагается, что территория охватывает сужение пролетных путей мигрирующих птиц - так называемое, «бутылочное горлышко», через которое пролетает не менее 1% европейской популяции какого-либо мигрирующего вида (колонка 4 в таблице 3).

Категория А4 применима для видов, уязвимость которых связана с образованием скоплений в местах гнездования, линьки, на зимовках и путях миграций. Данная категория включает также те остановочные пункты на путях миграции, на которых может не скапливаться значительного количества птиц одновременно, но через которые проходит большое число птиц благодаря их быстрой смене. Критерий А4.3 не рекомендуется использовать, если количественные данные достаточны для использования 1%-ного порога численности популяции либо 1%-ный порог численности вида намного превышает 20 000 особей или 10 000 пар.

В. Общеввропейские ключевые орнитологические территории

Категория В1:

Территория может быть выделена по одному из следующих критериев:

В1.1 - известно или предполагается, что на выделяемой территории обитает не менее 1% популяции, имеющей отношение к данному пролетному пути, или другой четко очерченной популяции водоплавающих и околоводных птиц, образующих скопления (колонка 5 в таблице 2 и колонка 5 в таблице 3);

В1.2 и В1.3 - не применимы на территории Нижегородской области;

В1.4 - территория представляет собой «бутылочное горлышко», через которое регулярно весной или осенью мигрируют не менее 5000 аистов или 3000 дневных хищных птиц или журавлей.

Категория В.2: территория является одной из наиболее важных в стране для сокращающихся численность, уязвимых, редких или локально гнездящихся в Европе видов, для охраны которых приемлем территориальный подход. Пороги численности приведены в колонке 6 таблицы 2.

Категория В.3: территория является одной из наиболее важных в стране для видов с благополучным природоохранным статусом в Европе, большая часть ареала которых (более 50%) расположена в Европе и для охраны которых приемлем территориальный подход. Пороги численности приведены в колонке 7 таблицы 2.

С. Федеральные ключевые орнитологические территории

Категория О: на выделяемой территории регулярно гнездятся, останавливаются на пролете, зимуют или линяют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды и популяции птиц России, занесенные в Красную книгу России. На территории Нижегородской области по данному критерию возможно выделение КОТР только на основании гнездовой численности таких птиц. Для придания КОТР федерального ранга необходимо, чтобы на ней гнездились не менее 1% численности охраняемых видов, подвидов или популяций в Европейской России (колонка 8 в таблице 2).

Категория С2:

Территория может быть выделена по одному из следующих критериев:

С2.1 - на выделяемой территории регулярно гнездится или концентрируется во внегнездовой сезон не менее 1 % российской численности какого-либо вида, морфологически выраженного подвида или географической популяции птиц;

С2.2 - на выделяемой территории концентрируется от 15 до 20 тысяч особей водоплавающих, куликов и голенастых птиц;

С2.3 - на выделяемой территории гнездится не менее 10 тыс. пар чает рода *Larus*, или не менее 8 тыс. пар других колониальных видов;

С2.4 - выделяемая территория располагается в пределах сужения пролетного пути - «бутылочного горлышка», через которое весной или осенью регулярно мигрирует большое количество хищных птиц; численность последних, однако, не достигает значений, позволяющих отнести данную территорию к КОТР международного значения по критериям А4.4 и В1 4.

К сожалению, пока не существует данных о численности большинства видов, подвидов и географических популяций птиц, населяющих Россию, поэтому использование критерия С2.1 чрезвычайно затруднено. Критерий С2.2 применим для скоплений птиц в местах зимовки, линьки и остановок в период пролета. По этому критерию выделяются, в том числе территории, где в период пролета одновременно скапливается менее 15 тысяч особей, однако в связи с быстрой сменой особей во время миграции, общее число останавливающихся здесь птиц превышает 15 тысяч.

Категория С3: выделяемая территория - важнейшее в каждом природном регионе России место гнездования, остановки на пролете, линьки или зимовки для уязвимых видов, подвидов и популяций птиц России, занесенных в Приложение 3 к Красной книге России. В связи с недостатком информации о численности этих птиц в конкретных природных регионах применение данного критерия в настоящее время невозможно.

Категория С4: выделяемая территория в течение десятилетий служит постоянной базой для массового отлова и кольцевания птиц в период миграций и долговременных орнитологических исследований популяционно-демографического профиля. Данный критерий позволяет взять на учет и сохранить места важнейших научных исследований нескольких поколений российских орнитологов на биостанциях, имеющих общероссийскую и международную известность.

Д. Ключевые орнитологические территории областного значения

Категория D1: здесь обитает (гнездится или концентрируется во внегнездовые сезоны) 1 % областной численности видов, подвидов и популяций, отнесенных к глобально редким или занесенных в Красную книгу России (колонка 9 в таблице 2 и колонка 6 в таблице 3).

Категория D2: здесь гнездится или концентрируется во внегнездовые сезоны 1 % областной численности видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области или в Приложение 3 к Красной книге Нижегородской области (колонка 10 в таблице 2 и колонка 7 в таблице 3).

Категория D3: здесь расположены постоянные гнездовые колонии голенастых, чайковых и других птиц, в которых численность гнездящихся птиц составляет не менее 1 % от численности в Нижегородской области (колонка 11 в таблице 2).

Категория D4: здесь гнездится или скапливается вне сезона гнездования значительное (в масштабах Нижегородской области) количество пар или особей охотничье-промысловых видов птиц (колонка 12 в таблице 2 и колонка 8 в таблице 3).

Категория D5: видовое разнообразие птиц на данной территории значительно превышает фоновые значения в Нижегородской области.

Категория D6: выделяемая территория длительное время служит базой для обучения студентов зоологических специальностей или же местом проведения постоянных орнитологических экскурсий.

Ключевые орнитологические территории должны, насколько это возможно, отвечать следующим условиям:

- отличаться по характеру биотопа или орнитологической значимости от окружающей территории;
- обладать в определенной степени свойствами самоподдерживающейся экосистемы, которая сама по себе или в совокупности с окружающими территориями обеспечивает длительное время экологические потребности обитающих на ней птиц.

Нет каких-либо фиксированных (максимальных или минимальных) размеров для ключевых орнитологических территорий. В каждом конкретном случае приходится сочетать знания о биологии вида с практическими возможностями охраны, принимать решение исходя из особенностей ландшафта, характера хозяйственной деятельности человека, возможных угроз для птиц и особенностей их экологии. Нет и готового ответа на вопрос о том, что лучше - серия отдельных ключевых территорий или одна большая территория. Это зависит от конкретных местных условий.

**Пороги гнездовой численности птиц,
служащие критериями выделения КОТР в Нижегородской области**

№	Вид	Пороги численности птиц (число гнездящихся пар), служащие критериями выделения КОТР									
		всемирных		между народных (европейских)			федеральных	областных			
		A1	A4.1	B1.1	B2	B3	C1	D1	D2	D3	D4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Чернозобая гагара	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
2.	Черношейная поганка	-	333	-	-	-	-	-	2	-	-
3.	Красношейная поганка	-	153	-	-	-	-	-	2	-	-
4.	Серошекая поганка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5.	Большая поганка	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
6.	Большая выпь	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
7.	Малая выпь	-	-	-	100	-	-	-	2	-	-
8.	Серая цапля	-	1300	1300	-	-	-	-	25	-	-
9.	Белый аист	-	-	-	35	-	-	-	1	-	-
10.	Черный аист	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-
11.	Серый гусь	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12.	Лебедь-шипун	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
13.	Лебедь-кликун	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14.	Кряква	-	27667	16667	-	-	-	-	-	-	90
15.	Чирок-свистунок	-	4667	3333	-	-	-	-	-	-	40
16.	Серая утка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17.	Свиязь	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
18.	Шилохвость	-	4200	4000	-	-	-	-	3	-	-
19.	Чирок-трескунок	-	6667	-	-	-	-	-	-	-	70
20.	Широконоска	-	1550	1400	-	-	-	-	9	-	-
21.	Красноголовый нырок	-	4500	3333	-	-	-	-	-	-	15
22.	Белоглазый нырок	20	-	-	-	-	5	1	-	-	-
23.	Хохлатая чернеть	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
24.	Обыкновенный гоголь	-	1300	1000	-	-	-	-	12	-	-
25.	Луток	-	300	200	-	-	-	-	1	-	-
26.	Длинноносый крохаль	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
27.	Большой крохаль	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
28.	Скопа	-	-	-	25	-	3	-	-	-	-
29.	Степной лунь	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Болотный лунь	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
31.	Змееяд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Орел-карлик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
33.	Большой подорлик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Малый подорлик	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
35.	Могильник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Беркут	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
37.	Орлан-белохвост	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Сапсан	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
39.	Чеглок	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
40.	Дербник	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4.1.	Кобчик	-	-	-	150	-	-	-	1	-	-
42.	Обыкновенная пустельга	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
32.	Белая куропатка	-	-	-	-	-	?	1	-	-	-
44.	<i>Тетерев</i>	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-
45.	<i>Перепел</i>	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-
46.	Серый журавль	-	667	83	-	-	-	-	122	-	-
47.	Пастушок	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
48.	Погоныш	-	-	-	-	100	-	-	-	-	10

1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11	12
49.	Малый погоныш	-	-	-	-	100	-	-	1	-	-
50.	Погоныш-крошка	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-
51.	Коростель	203	-	-	-	-	-	800	-	-	-
52.	Камышница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
53.	Лысуха	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
54.	Малый зуек	-	1067	-	-	-	-	-	-	-	15
55.	Чибис	-	23333	-	-	-	-	-	-	-	50
56.	Ходулочник	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
57.	Кулик-сорока	-	3667	3000	-	-	?⁴	2	-	-	-
58.	Фифи	-	3745	-	1000	-	-	-	5	-	-
59.	Большой улит	-	600	-	-	-	-	-	10	-	-
60.	Травник	-	1000	500	100	-	-	-	10	-	-
61.	Поручейник	-	100	-	-	-	-	-	5	-	-
62.	Мородунка	-	147	-	-	-	-	-	5	-	-
63.	Турухтан	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
64.	Дупель	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	Большой кроншнеп	-	1167	-	-	-	10	5	-	-	-
66.	Средний кроншнеп	-	-	-	-	100	-	-	1	-	-
67.	Большой веретенник	-	1319	1167	100	-	-	-	8	-	-
68.	Черноголовый хохотун	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
69.	Черноголовая чайка	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
70.	Малая чайка	-	228	-	110	-	-	-	5	-	-
71.	Озерная чайка	-	21667	-	-	-	-	-	-	170	-
72.	Клуша	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-
73.	Серебристая чайка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	Восточная клуша	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
75.	Хохотунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.	Сизая чайка	-	4205	-	400	-	-	-	-	170	-
77.	Черная крачка	-	569	-	200	-	-	-	20	-	-
78.	Белокрылая крачка	-	767	-	-	-	-	-	10	-	-
79.	Речная крачка	-	2600	2000	-	-	-	-	50	-	-
80.	Малая крачка	-	288	200	50	-	-	10	-	-	-
81.	Клинтух	-	-	-	-	100	-	-	8	-	-
82.	Глухая кукушка	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
83.	Филин	-	-	-	20	-	10	1	-	-	-
84.	Болотная сова	-	-	-	100	-	-	-	18	-	-
85.	Сплюшка	-	-	-	50	-	-	-	1	-	-
86.	Мохноногий сыч	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
87.	Домовый сыч	-	-	-	100	-	-	-	1	-	-
88.	Воробьиный сыч	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
89.	Ястребиная сова	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
90.	Серая неясыть	-	-	-	-	100	-	-	7	-	-
91.	Бородатая неясыть	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
92.	Сизоворонка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
93.	Обыкновенный зимородок	-	-	-	100	-	-	-	2	-	-
94.	Золотистая шурка	-	-	-	50	-	-	-	2	-	-
95.	Зеленый дятел	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
96.	Седой дятел	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
97.	Трехпалый дятел	-	-	-	100	-	-	-	8	-	-
98.	Береговая ласточка	-	-	-	10000	-	-	-	-	2000	-
99.	Лесной жаворонок	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
100.	Луговой конек	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
101.	Серый сорокопут	-	-	-	1000	-	-	2	-	-	-
102.	Кукша	-	-	-	100	-	-	-	1	-	-
103.	Оляпка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
104.	Речной сверчок	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	Обыкновенный сверчок	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
106.	Соловиный сверчок	-	-	-	-	100	-	-	1	-	-
107.	Пятнистый сверчок	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
108.	Вертялая камышевка	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-
109.	Северная бормотушка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ПО.	Ястребиная славка	-	-	-	-	1000	-	-	1	-	-
111.	Мухоловка-белошейка	-	-	-	-	50	-	-	1	-	-
112.	Луговой чекан	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
113.	Обыкновенная горихвостка	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
114.	Обыкновенный соловей	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
115.	Певчий дрозд	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
116.	Деряба	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
117.	Обыкновенный ремез	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
118.	Обыкновенная лазоревка	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
119.	Белая лазоревка	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
120.	Обыкновенная зеленушка	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
121.	Коноплянка	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
122.	Обыкновенная чечетка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
123.	Овсянка-ремез	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
124.	Дубровник	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
125.	Садовая овсянка	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ - Для птиц, не образующих пары, в качестве единиц измерения численности используются число выводков либо число токующих самцов

² - Для серого журавля порог численности 12 пар используется при выделении КОТР в Заволжье и Волжско-Окском междуречье. В Предволжье используется порог численности 6 пар.

³ - Для коростеля, отнесенного к глобально редким видам без учета российской численности, критерий выделения КОТР международного значения оказался значительно ниже областного. Поэтому для выделения КОТР (в том числе международного значения) специально для коростеля целесообразно пользоваться только областным порогом численности. Рекомендуемый по критерию А1 порог численности может использоваться только как дополнительное обоснование статуса КОТР, выделяемых для других видов птиц.

⁴ - Для белой куропатки и кулика-сороки, занесенных в Красную книгу РФ, численность в европейской части России не установлена. Поэтому невозможно указать порог численности для выделения КОТР по критерию СТ.

Курсивом отмечены названия видов, для которых выделение специальных КОТР не целесообразно. Указанные для них пороги численности могут использоваться как дополнительное обоснование статуса КОТР, выделяемых для других видов птиц.

Жирным курсивом отмечены пороги численности для выделения КОТР международного и федерального значения заведомо слишком высокие для использования на территории Нижегородской области. Эти цифры приведены для сведения.

Таблица 2

Пороги численности скоплений птиц на пролете и в предотлетный период, служащие критериями выделения КОТР в Нижегородской области

№	Вид	Пороги численности птиц (число особей), служащие критериями выделения КОТР					
		всех ирных		международных (европейских)	областных		
		A1	A4.1, A4.4	B1.1	D1	D2	D4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Краснозобая казарка	180	-	-	-	-	-
2.	Серый гусь	-	3500	200	-	50	-
3.	Белолобый гусь	-	12800	6000	-	-	600
4.	Гуменник	-	3800	3000	-	-	300
5.	Пискулька	15	-	-	-	-	-
6.	Лебедь-кликун	-	660	170	-	10	-
7.	Лебедь-шипун	-	-	-	-	10	-
8.	Утки (речные и нырковые)	-	-	-	-	-	2000
9.	Кряква	-	83000	50000	-	-	-
10.	Чирок-свистунок	-	14000	10000	-	-	-
11.	Связь	-	18000	12000	-	-	-
12.	Чирок-трескунок	-	20000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Широконоска	-	4650	4250	-	-	-
14.	Красноголовый нырок	-	13500	10000	-	-	-
15.	Белоглазый нырок	60	-	-	-	-	-
16.	Морская чернеть	-	3600	500	-	-	-
17.	Обыкновенный гоголь	-	3900	3000	-	-	-
18.	Луток	-	900	650	-	15	-
19.	Длинноносый крохаль	-	1850	500	-	15	-
20.	Большой крохаль	-	2200	100	-	15	-
21.	Степной лунь	30	-	-	-	-	-
22.	Большой подорлик	6	-	-	-	-	-
23.	Могильник	6	-	-	-	-	-
24.	Орлан-белохвост	15	-	-	-	-	-
25.	Серый журавль	-	2000	250	-	30	-
26.	Тулес	-	1700	-	-	-	-
27.	Золотистая ржанка	-	18000	10000	-	-	-
28.	Малый зуек	-	3200	-	-	-	-
29.	Чибис	-	70000	-	-	.	-
30.	Черныш	-	10000	-	-	-	-
31.	Фифи	-	11000	-	-	-	-
32.	Большой улит	-	1800	-	-	-	-
33.	Травник	-	3000	1500	-	-	-
34.	Щеголь	-	720	-	-	-	-
35.	Поручейник	-	300	-	-	-	-
36.	Перевозчик	-	15000	-	-	-	-
37.	Мородунка	-	440	-	-	-	-
38.	Турухтан	-	33000	-	-	-	-
39.	Кулик-воробей	-	2100	-	-	-	-
40.	Белохвостый песочник	-	3000	-	-	-	.
41.	Краснозобик	-	4500	-	-	-	-
42.	Чернозобик	-	22000	14000	-	-	-
43.	Песчанка	-	1200	-	-	-	-
44.	Грязовик	-	400	-	-	-	-
45.	Гаршнеп	-	660	-	-	-	-
46.	Бекас	-	54000	47000	-	-	.
47.	Дупель	60	-	-	-	-	-
48.	Большой кроншнеп	-	3500	-	-	-	-
49.	Большой веретенник	-	4200	3500	-	-	-
50.	Черноголовый хохотун	-	-	-	20	-	-
51.	Малая чайка	-	680	-	-	-	-
52.	Озерная чайка	-	65000	60000	-	-	-
53.	Сизая чайка	-	16000	-	-	-	-
54.	Черная крачка	-	1700	-	-	-	-
55.	Белокрылая крачка	-	2300	-	-	-	-
56.	Речная крачка	-	7800	6000	-	-	-
57.	Малая крачка	-	900	600	-	-	-

В данном каталоге в описании каждой КОТР приведены схемы территории. На схемах также нанесены ООПТ, способствующие сохранению КОТР. На схемах использованы следующие **условные обозначения**:



• граница КОТР



территория государственного
природного биосферного заповедника
«Керженский» и его оранной зоны



- территория памятника природы



- территория проектируемого памятника
природы



- территория комплексного заказника



территория проектируемого
комплексного заказника



- граница охотничьего заказника

Численность нуждающихся в охране птиц на КОТР
«Пойма р. Ветлуги и примыкающие массивы лесов и болот»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Черный аист	вер.гн.	1 пара	D1
Скопа	гн.	1-2 пары	D1
Большой подорлик	гн.	1-2 пары	A1
Серый журавль	гн.	41 территориальная пара	D2
Коростель	гн.	100-200 то кующих самцов	A1
Кулик-сорока	гн.	17 пар	C1?
Утки (речные и нырковые)	гн.	6000-11000 особей (в июле-августе)	D4
Дневные хищные птицы	пр.	2500 особей	C2.4

отмечен большой крохаль, занесенный в Красную книгу Нижегородской области. Общая численность мигрирующих через КОТР водоплавающих и околоводных птиц (в том числе одновременно присутствующих на всей ее площади) не установлена. В октябре 1990 г. расчетная численность мигрировавших через КОТР дневных хищных птиц составила 2,5 тыс. особей. Среди мигрантов зарегистрирован орлан-белохвост.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота в устье р. Вол, сплошные и выборочные рубки леса в местах гнездования редких видов птиц, вероятная браконьерская охота на редкие виды, фактор беспокойства. Существует потенциальная угроза торфоразработок и осушения болот.

На данной территории существует один памятник природы областного значения (ПШ) «Исправникова дуга» (около 4% площади КОТР), спроектированы и зарезервированы еще один памятник природы («Болото Большой Мокрый») и комплексный заказник «Ветлужский». После организации спроектированных ООПТ большая часть КОТР окажется под охраной.

2. Массив лесов и болот в низовьях р. Б. Какша

Статус КОТР - международный (всемирный).

Основная часть КОТР находится в Ветлужском районе, участок на востоке территории - в Шахунском. Площадь территории - 213,18 км². КОТР охватывает пойму и левобережные надпойменные террасы участка р. Ветлуга от северной границы Нижегородской области до д. Большая Микриха Ветлужского района, а также пойму и надпойменные террасы в низовьях р. Большая Какша от д. Красная Шахунского района до устья. Схема территории показана на рисунке 3.

На КОТР разновозрастные производные пойменные леса с сохранившимися низинными черноольховыми болотами и небольшими фрагментами пойменных лугов. На надпойменных террасах располагаются крупные переходные и верховые болота, перемежающиеся с сосновыми (в том числе с участием лиственницы сибирской), сосново-еловыми и мелколиственными лесами разного возраста. Встречаются небольшие участки суходольных лугов на месте заброшенных населенных пунктов.

КОТР служит местом произрастания пальчато-коренника Траунштейнера (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, махаона,




Рис. 3. Схема КОТР «Массив лесов и болот в низовьях р. Б. Какша»

кляквы мелкоплодной, березы приземистой, ив черниковидной и лапландской, осок струнокорневой и двудомной, ладьяна трехнадрезного, дремлика болотного, княженики, жимолости Палласа, росянки английской.

Лесные земли занимают около 95% территории и относятся к государственному лесному фонду Ветлужского и Вахтанского лесхозов, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Ветлужский межхозяйственный лесхоз. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Одним из основных источников доходов населения примыкающих территорий являются ресурсы кляквы, сосредоточенные на болотах КОТР. Сельхозугодья и территории бывших населенных пунктов занимают около 5% площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в таблице 5.

Таблица 5

Численность нуждающихся в охране птиц на КОТР
«Массив лесов и болот в низовьях р. Б. Какша»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Беркут	вер.гн.	1 пара	D1
Большой подорлик	гн.	1-2 пары	A1
Змееяд	гн.	1 пара	D1
Сапсан	вер. гн.	1 пара	D1
Серый журавль	гн.	30 территориальных пар	D2
Коростель	гн.	30-40 токующих самцов	A1
Филин	гн.	1 пара	D1

На КОТР установлено гнездование серого сорокопута (Красная книга РФ), а также занесенных в Красную книгу Нижегородской области глухой кукушки и трехпалого дятла.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса в местах гнездования редких видов птиц, вероятная браконьерская охота на редкие виды, фактор беспокойства. Существует потенциальная угроза торфоразработок и осушения болот.

Здесь спроектированы и зарезервированы 5 памятников природы («Болото Казанское», «Болото Закорино-Белое», «Болото Катино», «Болота Елховс-

кое, Ченебечица и Обабочное», «Массив высоковозрастных хвойных лесов около устья р. Б.Какша»), территория которых занимает около 30% КОТР, включая участки, наиболее значимые для охраняемых видов.


3. Участки высоковозрастных хвойных лесов и болот в низовьях р. Б.Вахтан

Статус КОТР - областной.

КОТР находится на р. Большой Вахтан на севере Шахунского района в 4 км к северо-западу от р.п. Вахтан и занимает площадь 12,34 км². Схема территории показана на рисунке 4.

КОТР представляет собой полосу высоковозрастного пихтово-елового леса с участками низинных древесных болот по пойме р. Большой Вахтан и примыкающие участки сосновых лесов с небольшими верховыми болотами на надпойменных террасах.

КОТР служит местом произрастания лобарии легочной (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: подалирия, манника литовского, рдеста длиннейшего, малины хмелелистной, лютика Кауфмана.



Лесные земли занимают всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Вахтанского лесхоза. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством.

Территория отнесена к КОТР областного значения по критерию D1 на основании обнаружения одного гнезда большого подорлика (глобально редкий вид, занесен в Красную книгу РФ). Из птиц, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, здесь гнездятся серый журавль (5 территориальных пар) и седой дятел.

Основную угрозу деградации для данной КОТР представляют сплошные и выборочные рубки леса. Существует потенциальная угроза осушения болот.

Спроектирован и зарезервирован памятник природы «Участки хвойных лесов и болот в низовьях р. Большой Вахтан», занимающий 40% территории КОТР.

Рис. 4. Схема КОТР «Участки высоковозрастных хвойных лесов и болот в низовьях р. Б.Вахтан»

4. Пижемский заказник

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена на северо-востоке Нижегородской области: в северо-восточной части Шахунского и в северо-западной части Тоншаевского районов, примыкая к границе Нижегородской области с Кировской. КОТР находится на Заволжской пологохолмистой равнине, на северных склонах Шахунских увалов, в бассейне р. Пижмы (правого притока р. Вятки). Площадь КОТР - 296,8 км². Схема территории показана на рисунке 5.




Рис. 5. Схема КОТР «Пижемский заказник»

КОТР в целом представляет собой крупные массивы верховых и переходных болот, перемежающиеся с сосновыми лесами разного возраста. Болота занимают около 50% территории, в том числе на долю верховых и переходных болот приходится 44%, низинных - 6%. Леса занимают 46% территории, в том числе сосняки - 31%, ельники - 5%, березняки и осинники - 9%. В основном вдоль р. Пижмы сохранились фрагменты высоковозрастных пихтово-еловых лесов с дубравными элементами (3% площади КОТР). Около 5% территории занимают участки старовозрастных сосновых боров, приуроченные обычно к окраинам болот и внутренним суходолам. На долю свежих вырубок (последних 10 лет) приходится 3% площади, суходольных и пойменных лугов - около 1%.

КОТР служит местом обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений, занесенных в Красную книгу РФ: мнемозины, венерина башмачка настоящего, лобарии легочной, а также занесенных в Красную книгу Нижегородской области: ночниц Брандта, прудовой и водяной, северного кожанка, рыжей вечерницы, лесного нетопыря, выдры, бурундука, красной полевки, обыкновенной гадюки, махаона, ленты орденской голубой, баранца обыкновенного, княженики, малины хмелистой, клюквы мелкоплодной, княжика сибирского, жимолости Палласа, ив лапландской и черниковидной, башмачка крапчатого, ладьяна трехнадрезного, мытника скипетровидного, осоки струнокорневой, рдеста длиннейшего, манника литовского.

Лесные земли занимают практически всю территории и относятся к государственному лесному фонду Пижемского и Вахтанского лесхозов. В лесах, за исключением особо защитных участков Пижемского заказника (36,6% площади КОТР) ведутся рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Одним из основных источников доходов населения примыкающих территорий являются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах КОТР.

На КОТР зарегистрированы 109 видов птиц, в том числе 5 занесенных в Красную книгу РФ и еще 10, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (табл. 6).

КОТР имеет всемирное значение по критерию А3: на ней гнездятся 5 видов, распространение которых ограничено таежным биомом (большой улит, бородастая неясыть, кукушка, выюрок, овсянка-ремез).

Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в таблице 7.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса (средняя степень угрозы); весенняя охота и вероятная браконьерская охота на редкие виды (низкая степень угрозы).

Список видов птиц, зарегистрированных на КОТР «Пижемский заказник»

№	Вид	Характер пребывания	№	Вид	Характер пребывания	№	Вид	Характер пребывания
1.	Черный аист**	возм. гн.	38.	Воробьиный сыч	гн.	75.	Мухоловка-пеструшка	гн.
2.	Кряква	гн.	39.	Длиннохвостая неясыть	га	76.	Малая мухоловка	гн.
3.	Чирок-свистунок	гн.	40.	Бородатая неясыть*	гн.	77.	Серая мухоловка	гн.
4.	Шилохвость	гн.	41.	Европейский козодой	гн.	78.	Луговой чекан	гн.
5.	Обыкновенный гоголь	гн.	42.	Черный стриж	гн.	79.	Обыкновенная горихвостка	гн.
6.	Большой крохаль*	пр.	43.	Обыкновенный зимородок*	гн.	80.	Зарянка	гн.
7.	Обыкновенный осоед	гн.	44.	Желна	гн.	81.	Обыкновенный соловей	гн.
8.	Черный коршун	гн.	45.	Большой пестрый дятел	гн.	82.	Варакушка	гн.
9.	Полевой лунь	гн.	46.	Трехпалый дятел*	гн.	83.	Рябинник	гн.
10.	Луговой лунь	гн.	47.	Деревенская ласточка	гн.	84.	Белобровик	гн.
П.	Тетеревятник	гн.	48.	Лесной жаворонок	гн.	85.	Певчий дрозд	гн.
12.	Перепелятник	гн.	49.	Лесной конек	гн.	86.	Деряба	гн.
13.	Зимняк	пр., лет.	50.	Белая трясогузка	гн.	87.	Буроголовая гаичка	гн.
14.	Канюк	гн.	51.	Обыкновенный жулан	гн.	88.	Хохлатая синица	гн.
15.	Беркут**	гн.	52.	Обыкновенная иволга	гн.	89.	Московка	гн.
16.	Чеглок	га	53.	Обыкновенный скворец	гн.	90.	Обыкновенная лазоревка	гн.
17.	Обыкновенная пустельга	гн.	54.	Кукша*	вер. гн.	91.	Белая лазоревка**	вер. гн.
18.	Тетерев	гн.	55.	Сойка	гн.	92.	Большая синица	гн.
19.	Глухарь	гн.	56.	Сорока	гн.	93.	Обыкновенный поползень	гн.
20.	Рябчик	гн.	57.	Серая ворона	гн.	94.	Обыкновенная пищуха	гн.
21.	Серый журавль*	гн.	58.	Ворон	гн.	95.	Домовый воробей	гн.
22.	Коростель	гн.	59.	Крапивник	гн.	96.	Зяблик	гн.
23.	Чибис	гн.	60.	Лесная завирушка	гн.	97.	Вьюрок	гн.
24.	Черныш	гн.	61.	Речной сверчок	гн.	98.	Обыкновенная зеленушка	гн.
25.	Фифи*	га	62.	Камышевка-барсунок	гн.	99.	Чиж	гн.
26.	Большой улит	гн.	63.	Садовая камышевка	гн.	100.	Черноголовый шегол	гн.
27.	Перевозчик	гн.	64.	Болотная камышевка	гн.	101.	Коноплянка	гн.
28.	Бекас	гн.	65.	Зеленая пересмешка	гн.	102.	Обыкновенная чечетка*	вер.гн.
29.	Вальдшнеп	га	66.	Ястребинная славка*	вер. гн.	103.	Обыкновенная чечевица	гн.
30.	Большой кроншнеп**	гн.	67.	Черноголовая славка	гн.	104.	Обыкновенный клест	гн.
31.	Озерная чайка	лет.	68.	Садовая славка	гн.	105.	Обыкновенный снегирь	гн.
32.	Вяхирь	га	69.	Серая славка	гн.	106.	Обыкновенная овсянка	гн.
33.	Обыкновенная кукушка	гн.	70.	Пеночка-весничка	гн.	107.	Овсянка-ремез	гн.
34.	Глухая кукушка*	гн.	71.	Пеночка-теньковка	гн.	108.	Дубровник	гн.
35.	Филин**	гн.	72.	Пеночка-трещетка	гн.	109.	Садовая овсянка	гн.
36.	Болотная сова	гн.	73.	Зеленая пеночка	гн.			
37.	Мохноногий сыч	гн.	74.	Желтоголовый королек	гн.			

Примечание: ** - вид занесен в Красные книги РФ и Нижегородской области, * - вид занесен в Красную книгу Нижегородской области.

Таблица 7

Численность нуждающихся в охране птиц на КОТР «Пижемский заказник»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Черный аист	возм. гн.	1 пара	D1
Беркут	гн.	1-2 пары	B2
Серый журавль	гн.	49 территориальных пар	D2
Коростель	гн.	10-20 токующих самцов	-
Большой кроншнеп	гн.	не менее 10 пар	C1
Филин	гн.	1-2 пары	D1
Бородатая неясыть	гн.	1 пара	D2

Территория КОТР полностью совпадает с границами Пижемского государственного природного комплексного заказника областного значения.

5. Одошнурский пруд

Статус КОТР - областной.

КОТР находится на севере Тоншаевского района между д. Большой Одошнур, д. Малый Одошнур и бывшей д. Чентонер в среднем течении р. Юрика. Площадь КОТР - 1,68 км². Схема территории показана на рисунке 6.

Территория включает пруд площадью 9,3 га с постоянным гидрологическим режимом и его водоохранную зону. Пруд вытянут в направлении с запада на восток. Его длина - 1300 м, наибольшая ширина около дамбы - 240 м. Пруд разделен поперечной дамбой на две неравные части. Нижняя, основная, часть имеет площадь 8,1 га. На ней прибрежная и водная растительность развита слабо и занимает не более 7 % площади водного зеркала. По урезу воды вдоль всех берегов тянется прерывистый пояс прибрежной растительности с доминированием осок. Только на мелководьях в верховьях данной части пруда представлены заросли хвоща приречного с отдельными маленькими куртинами рогоза широколистного. Эти заросли тянутся от разделяющей пруд дамбы вдоль южного берега полосой, имеющей ширину до 50 м и длину до 300 м. Верхняя мелководная отделенная дамбой часть пруда имеет площадь 1,2 га, длину - 250 м, ширину - 50-70 м. Она практически полностью заросла прибрежной и водной растительностью, в верховьях из воды торчат сухие затопленные деревья.




Рис. 6. Схема КОТР «Одошнурский пруд»

Прибрежная растительность образует сплошные пояса: 1) - осок с участием хвоща приречного, ширина пояса - около 10 м; 2) - хвоща приречного с вкраплением куртин рогоза широколистного, ширина пояса 5-6 м; 3) - рогоза широколистного, ширина - от 2 до 10 м. По всему водному зеркалу разбросаны участки сплавин, образованных рогозом широколистным. В целом прибрежная растительность занимает около 30 % площади водного зеркала данной части пруда. Остальную часть площади занимают заросли погруженных водных растений и водных растений с плавающими листьями. Среди них доминирует элодея канадская, встречаются также кубышка желтая и рдест плавающий.

КОТР расположена на землях ТОО «Одошнурский».

Имеющиеся сведения о численности водоплавающих и околотовных птиц на данной территории (по результатам учета в июне 1990 г.) приведены в таблице 8.

Колония крачек расположена в верхней мелководной части пруда. Площадь колонии - 0,25 га. Кроме видов, указанных в таблице, на пруду гнездятся: мордунка (Красная книга Нижегородской области), камышница, обыкновенный погоныш, большой улит, черныш, перевозчик, бекас.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: спуск пруда в результате старения и разрушения гидротехнических сооружений. Возможен ущерб от весенней охоты и браконьерства.

Территориальной охраны нет.

Необходимые меры охраны: после дополнительного обследования присвоение статуса территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением о Красной книге Нижегородской области».

Численность водоплавающих и околотовных птиц на КОТР «Одошнурский пруд»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Большая выпь	гн.	1 пара	-
Лебедь-шипун	лет.	4 неполовозрелых особи	D2
	возм.гн.	1 пара	
Чирок-треску нок	гн.	8 особей	-
Свиязь	гн.	2 особи	-
Хохлатая чернеть	гн.	5 особей	-
Болотный лунь	гн.	1 пара	-
Черный коршун	гн.	2 пары	-
Черная крачка	гн.	50 пар	D2
Речная крачка	гн.	1-2 пары	-

6. Участки пойм р. Ошма и р. Пижма на северо-востоке Тоншаевского района и территория предотлетного скопления серых журавлей

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в северо-восточной части Тоншаевского района и примыкающей территории Тужинского района Кировской области на площади 205,27 км² (в том числе в Нижегородской области - около 120 км²). Схема территории показана на рисунке 7.

КОТР включает массив молодых и средневозрастных березняков и осинников с небольшими фрагментами высоковозрастных пихтово-еловых лесов с дубравными элементами (расположенный в основном в Нижегородской области), а также примыкающие к нему участки сельскохозяйственных угодий: пойменных лугов, залежей, полей зерновых (в основном в Кировской области). В пойме р. Пижмы в Кировской области расположено низинное болото.




Рис. 7. Схема КОТР «Участки пойм р. Ошма и р. Пижма на северо-востоке Тоншаевского района и территория предотлетного скопления серых журавлей»

Леса данной территории служат местом произрастания лобарии легочной (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: ночницы Брандта, обыкновенной гадюки, княжика сибирского, диплазия сибирского, какалии копьевидной, княженики.

Лесные земли занимают около 70% территории. На территории Нижегородской области лесные земли относятся к государственному лесному фонду Пижемского лесхоза,

и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Тоншаевский межхозяйственный лесхоз. В настоящее время лесохозяйственные мероприятия практически не проводятся. Сельхозугодья занимают около 30% площади. На территории Нижегородской области они в основном представляют собой залежи, зарастающие лесом. В Кировской области часть пашни используется для выращивания зерновых культур.

КОТР служит местом предотлетного скопления серых журавлей (100-300 особей - критерий D2). В настоящее время журавли собираются только на территории Кировской области (ночуют на низинном болоте в пойме р. Пижмы, кормятся на полях). В лесном массиве на территории Нижегородской области гнездятся филин (1 пара - критерий D1) и глухая кукушка. Устье р. Ошмы - место остановки на пролете большого числа водоплавающих и околоводных птиц.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сокращение используемых сельскохозяйственных площадей приводит к уменьшению численности собирающихся осенью журавлей. Значительную угрозу представляет также браконьерская охота.

Созданный на части КОТР ГПП «Участки южнотаежных лесов в Буреполомском лесничестве» (около 52% площади КОТР) обеспечивает сохранение местообитаний лесных видов. Территория предотлетного скопления журавлей не охраняется.

7. Унженский отрог Горьковского водохранилища и примыкающие территории

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена в основном в северной части Сокольского района, заходит в Ковернинский район и в Макарьевский район Костромской области. Площадь КОТР - 490,50 км² (из них 424 км² - в Нижегородской области). Схема территории показана на рисунке 8.

КОТР включает мелководный отрог Горьковского водохранилища и примыкающий массив сосновых, лиственнично-сосновых (в том числе высоковозрастных) лесов, верховых и переходных болот. Леса занимают 72% территории (в том числе сосновые и лиственнично-сосновые - 57%, мелколиственные - 15%), пойменные и водораздельные луга - по 0,5%, верховые болота - 4%, переходные болота - 6%, низинные болота - 1%, водоемы - 15%, песчаные пляжи - 0,5%, населенные пункты - 0,5%. Данный лесной массив - важнейший в Нижегородской области «остров» естественного произрастания лиственницы сибирской, где сохранились фрагменты старовозрастных лиственнично-сосновых и лиственничных лесов.

КОТР служит местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: выдры, лесного нетопыря, прудовой ночницы, обыкновенной гадюки, речного гольяна, махаона, росянки английской, осоки малоцветковой, клюквы мелкоплодной, морошки, лютика Кауфмана, ивы черниковидной, батрахосперма четковидного.

Лесные земли занимают 83% территории и относятся к государственному лесному фонду Волжского, Сокольского, Ковернинского лесхозов Нижегородской области и Макарьевского лесхоза Костромской области. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного

лиственничного леса у с. Высоково», «Болото Малое»), занимающих незначительную часть КОТР (около 7%).

Составлены и согласованы с органами местного самоуправления Сокольского района проекты организации 4 памятников природы: «Болото Шелехонское (Козловское) и прилегающий лесной массив» площадью 2760 га, «Массив лесов и болот вокруг бывшего поселка Пятилетка» площадью 1716 га, «Болото Текунское с оз. Текун и окружающий лесной массив» площадью 909,4 га, «Лесной массив у пос. Ново-Шомохтинский в Унженском лесничестве» площадью 141 га. После их организации под охраной окажутся наиболее ценные участки КОТР, занимающие 18% ее площади.

8. Массив лесов и болот в истоках рек Керженец, Лапшанга, Черный Лух

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в северо-восточной части Ковернинского района и занимает площадь 271,52 км². На данной территории представлены разновозрастные сосновые и мелколиственные леса с фрагментами сохранившейся елово-сосновой тайги и небольшими верховыми и переходными болотами. Схема территории показана на рисунке 9.




Рис. 9. Схема КОТР «Массив лесов и болот в истоках рек Керженец, Лапшанга, Черный Лух»

ского лесхозов. В лесах за исключением территории памятника природы ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством.

Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в таблице 10.

Данные о численности нуждающихся в охране птиц на КОТР «Массив лесов и болот в истоках рек Керженец, Лапшанга, Черный Лух»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Беркут	гн.	1 пара	D1
Дербник	гн.	1 пара	D2
Серый журавль	гн.	5 территориальных пар	-
Филин	гн.	1 пара	D1
Сплюшка	гн.	1 пара	D2

истоков р. Керженец». Основную часть территории занимает Ковернинский охотничий заказник, режим которого не обеспечивает сохранение местообитаний птиц. С целью сохранения старовозрастных лесов спроектирован комплексный заказник, охватывающий почти всю КОТР.

КОТР служит местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: рыжей вечерницы, лесного нетопыря, двухцветного кожаня, обыкновенной гадюки, подалирия, махаона, клюквы мелкоплодной, ивы черниковидной, княженики, осоки малозеленой.

Лесные земли занимают всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Ковернинского и Ветлужско-Унжен-

Кроме видов, указанных в таблице, на КОТР гнездятся занесенные в Красную книгу

Нижегородской области: кукушки (Красная книга РФ) гнездилась здесь до 1970-х гг.; в настоящее время встречается во время кочевок, гнездование маловероятно.

Основная угроза деградации данной территории как КОТР - сплошные рубки главного пользования.

Наиболее крупный участок высоковозрастных лесов (около 11% КОТР) взят под охрану в качестве памятника природы «Лес у

9. Лесной массив по р.р. Шада и Аграфенка

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в северо-западной части Варнавинского района и занимает 84,26 км². На территории представлены участки высоковозрастных пихтово-еловых лесов с дубравными элементами, окруженные разновозрастными березняками и осинниками. Схема территории показана на рисунке 10.


КОТР служит местом произрастания венерина башмачка настоящего (Красная книга РФ), местом обитания бурундука, занесенного в Красную книгу Нижегородской области.

Вся территория КОТР покрыта лесами, которые относятся к государственному лесному фонду Ветлужско-Унженского и Варнавинского лесхозов. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством.

На данной территории гнездится 1-2 пары филинов (критерий D1).

Угрозу для данной КОТР могут представлять браконьерская охота и незаконные порубки на территории памятника природы.

Около 35,5% территории КОТР взято под охрану в качестве памятника природы «Участки пихтово-еловых лесов по р.р. Шада и Аграфенка» и его охранной зоны.



10. Варнавинский заказник

Статус КОТР - вероятно международный (европейский).

КОТР расположена в восточной части Варнавинского района и тянется вдоль всего находящегося в пределах района участка реки Ветлуги, охватывая ее пойму и на надпойменные террасы. Площадь КОТР - 362,0 км². Схема территории показана на рисунке 11.

КОТР включает полосу речной поймы с сохранившимися участками высоковозрастных пойменных дубрав, прирусловыми ивняками, низинными болотами и заливными лугами. На надпойменных террасах - массивы сосновых лесов с крупными старовозрастными участками, а также с небольшими верховыми и переходными болотами. Эти леса - один из «островов» естественного произрастания лиственницы сибирской в нашей области. Лиственница сохранилась в небольшом количестве на отдельных участках. Разновозрастные производные березняки и осинники занимают около трети территории.

КОТР служит местом обитания выхухолы (Красная книга РФ), а также выдры и обыкновенной гадюки, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают более 90% территории и относятся к государственному лесному фонду Варнавинского лесхоза и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Варнавинский межхозяйственный лесхоз. На территории ведется лесохозяйственная деятельность: в основном сплошные и выборочные санитарные рубки в сосняках, усыхающих после подсочки конца 1980-х гг. Распространены случаи самовольной порубки леса. Сельхозугодья (пойменные луга) используются в качестве сенокосов и, реже, пастбищ. При этом сенокосные угодья в последние годы используются далеко не на всей площади. Земли населенных пунктов занимают незначительную часть территории (менее 1%).

Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в таблице 11. На КОТР встречается на пролете и, возможно, гнездится скопа. Территория, вероятно, играет важную роль как участок пролетного пути и место остановок на пролете водоплавающих и околоводных птиц, но выяснение этого вопроса требует дополнительных исследований.



Рис. 11. Схема КОТР «Варнавинский заказник»

Данные о численности нуждающихся в охране птиц на КОТР «Варнавинский заказник»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая иаглия	гн.	7 пар	-
Серый журавль	гн.	12 территориальных пар	D2
Речная крачка	гн.	80-140 пар	D2
Сизая чайка	гн.	20-30 пар	-
Озерная чайка	гн.	20-30 пар	-
Малая крачка	гн.	25-50 пар	B2?
Черная крачка	гн.	5-10 пар	-
Ремез	гн.	1-2 пары	D2

Основную угрозу для данной КОТР представляют усыхание сосновых лесов в результате производившейся ранее подсоски с применением химических стимуляторов, а также сплошные и выборочные рубки леса (в том числе самовольные), лесные пожары и браконьерская охота. В будущем вероятен рост рекреационной нагрузки и связанного с ним фактора беспокойства.

Границы КОТР совпадают с границами Варнавинского государственного природного комплексного заказника областного значения.

11. Массив верховых и переходных болот в Краснобаковском районе

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в центральной части Краснобаковского района и занимает 41,4 км². Схема территории показана на рисунке 12.

На КОТР представлены верховые и переходные болота, перемежающиеся с разновозрастными сосняками. Болота служат местом произрастания ивы черниковидной и клюквы мелкоплодной, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Краснобаковского лесхоза-техникума. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Одним из основных источников доходов населения примыкающих территорий являются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах КОТР.

Болота служат местообитанием серого журавля: учтено 13 территориальных пар (критерий D2), отмечен также серый сорокопут (Красная книга РФ).

Потенциальную угрозу для КОТР представляют возможный рост рекреационной нагрузки и фактора беспокойства, а также лесные пожары.

Существующие здесь 5 памятников природы («Болота Токовые», «Болото Клюквенное», «Болото Гонабобельное», «Болото Трубино I и II», «Болото Глухарное») занимают около 54 % площади КОТР и полностью обеспечивают сохранение местообитаний птиц.




Рис. 12. Схема КОТР «Массив верховых и переходных болот в Краснобаковском районе»

12. Поймы рек Уста и Вая

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена в Уренском районе и примыкает с юга к районному центру. Площадь КОТР - 217,28 км². Схема территории показана на рисунке 13.

КОТР включает крупные массивы пойменных лугов, местами подвергнутых мелиорации, и примыкающие хвойные и мелколиственные леса разного возраста. Леса занимают 76% площади (из них березняки и осинники - 40%, хвойные леса - 36%), пойменные луга - 16,5%, верховые болота - 2%, низинные болота - 5%, реки и ручьи - 0,5%.

КОТР служит местом произрастания венерина башмачка настоящего (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: ночниц водяной и Брандта, шмеля мохового, княженики, кувшинки белой, малины хмелелистной, манника литовского, рдестов длиннейшего и Фриса, баранца обыкновенного, гроздовника многораздельного.

Лесные земли занимают около 80% территории и относятся к государственному лесному фонду Уренского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Уренский межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают около 20% площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ. Земли населенных пунктов занимают менее 1% территории.

Орнитологическая характеристика данной территории приведена в таблице 12.



Рис. 13. Схема КОТР «Поймы рек Уста и Вая»

Таблица 12

Орнитологическая характеристика КОТР «Поймы рек Уста и Вая»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Краснозобая казарка	пр.	3-5 особей	-
Гуси	пр. (единовременно)	2500-3000 особей	D4
Речные и нырковые утки	пр. (единовременно)	1000 особей	-
Змееяд	пр.	2 особи	-
Серый журавль	гн.	11 территориальных пар	D2
Коростель	гн.	400-700 токующих самцов	A1
Дупель	гн.	минимум 120 токующих самцов	A1
Сизая чайка	гн.	4 пары	-
Чайки	пр. (единовременно)	250 особей	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР: восстановление разрушающейся мелиоративной сети для осушения территории, весенняя охота, браконьерство, сплошные рубки главного пользования, местами - перевыпас скота. Существует потенциальная угроза торфоразработок.

Территориальная охрана обеспечена недостаточно - основные местообитания птиц находятся за пределами трех существующих здесь памятников природы («Участки высоковозрастных южно-таежных лесов по рекам Усте и Вае», «Участок высоковозрастного леса по р. Усте около с. Большое Карпово», «Озера Кочешковское и Титковское окружающий их заболоченный лесной массив»). Охраняется около 7% площади КОТР.

13. Массив высоковозрастных южнотаежных лесов по р. Ижма

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на Заволжской низменной равнине, в левобережье р. Ветлуги, протянувшись тридцатикилометровой полосой вдоль р. Ижмы, левого притока р. Усты. Основная часть КОТР расположена в Воскресенском районе, часть территории заходит в Краснобаковский район. Площадь КОТР - 94,77 км². Схема территории показана на рисунке 14.

КОТР представляет собой массив малонарушенных рубками пихтово-еловых лесов с дубравными элементами и примыкающих разновозрастных сосновых и мелколиственных лесов.

КОТР служит местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красные книги РФ и Нижегородской области: подкаменщика обыкновенного, бестряпки, мнемозины, венерина башмачка настоящего,

пальчатокоренника Траунштейнера, лобарии легочной, а также занесенных в Красную книгу Нижегородской области: ночницы Брандта, лесного нетопыря, рыжей вечерницы, гадюки обыкновенной, подалирия, переливницы большой, пузырьника судетского, голокучника Роберта, диплазиума сибирского, манника литовского, воронца красноплодного, баранца обыкновенного, лютика Кауфмана.

Лесные земли занимают основную часть площади КОТР и относятся к государственному лесному фонду Воскресенского и Шеманихинского лесхозов. Сельхозугодья занимают около 2% площади, и в основном представляют собой неиспользуемые залежи.

На данной территории отмечен змеяед, занесенный в Красную книгу РФ (1 пара, критерий D1). Из видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, зарегистрированы клintух, глухая кукушка, трехпалый дятел. Кроме того, здесь гнездятся виды, нуждающиеся в особом контроле за численностью на территории Нижегородской области: осоед, полевой и луговой луни, обыкновенная пустельга, коростель, мохноногий сыч, воробьиный сыч, крапивник, лесная завирушка, овсянка-ремез.

Существует потенциальная угроза сплошных и выборочных рубок леса, которые приведут к деградации территории.

Спроектирован и зарезервирован памятник природы «Массив южнотаежных лесов по р. Ижма (в Воскресенском районе)», занимающий около 36,6 % площади КОТР.




Рис. 14. Схема КОТР «Массив высоковозрастных южнотаежных лесов по р. Ижма»

14. Массив лесов и болот в Красноярском лесничестве Воскресенского лесхоза и территория предотлетного скопления серых журавлей у с. Попово и Черново




Рис. 15. Схема КОТР «Массив лесов и болот в Красноярском лесничестве Воскресенского лесхоза и территория предотлетного скопления серых журавлей у с. Попово и Черново»

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР расположена на Заволжской низменной равнине, в левобережье реки Ветлуги в основном в пределах междуречья Ветлуги и ее левого притока Усты; в центральной части Воскресенского района. Площадь КОТР - 452,94 км². Схема территории показана на рисунке 15.

КОТР включает массив разновозрастных основных и мелколиственных лесов с многочисленными верховыми, переходными и низинными болотами, фрагментами сохранившейся старовозрастной пихтово-еловой тайги, а также примыкающее обширное ополье.

КОТР служит местом произрастания пальчатокоренника Траунштейнера (Красная книга РФ); местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, подалирия, ив черниковидной и лапландской, клюквы мелкоплодной, осоки малоцветковой.

Лесные земли занимают около 60% территории и относятся к государственному лесному фонду Воскресенского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Воскресенский межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением особо защитных участков зарезервированного заказника площадью 48,02 км² ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки промежуточного и главного пользования, намеченные лесоустройством. Одним из основных источников доходов населения примыкающих территорий являются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах КОТР. Сельхозугодья занимают около 40% площади. Основная их часть представляет собой зарастающие лесом залежи. Лишь небольшая часть пахотных угодий, принадлежащая в основном СТ «Елkinsкое», используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Земли населенных пунктов занимают 1,5% территории.

Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в таблице 13.

Таблица 13

Данные о численности нуждающихся в охране птиц на КОТР «Массив лесов и болот в Красноярском лесничестве Воскресенского лесхоза и территория предотлетного скопления серых журавлей у с. Попово и Черново»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая цапля	гн.	6-7 пар	-
Серый журавль	гн.	20 территориальных пар	D2
	предотлетное скопление	100-500 особей*	B1.1
Большой кроншнеп	гн.	10-15 пар	C1
Сизая чайка	гн.	20-30 пар	-
Озерная чайка	гн.	30-35 пар	-
Речная крачка	гн.	83-140 пар	D2
Малая крачка	гн.	42-76 пар	B2

* - В разные годы численность предотлетного скопления журавлей составляла: в 1985 году - 298 особей, в 1986 году - 100 особей, в 1987 году - 120 особей, в 1988 году - 130 особей, в 1989 году - 160 особей, в 1990 году - 210 особей. 16 сентября 1994 года скопление насчитывало около 250 птиц. По свидетельствам местных жителей, максимум численности в 1994 году (около 10-13 сентября) достигал 500 особей. В дальнейшем численность составляла: в 1998 г. - 260 особей, в 1999 г. - 92 особи, в 2000 г. - 223 особи, в 2001 г. - 98 особей, в 2002 г. - 99 особей, в 2003 г. - 112 особей.

На данной территории гнездится кулик-сорока, вероятно гнездование орлана-белохвоста и серого сорокопута (Красная книга РФ); из видов Красной книги Нижегородской области гнездятся мородунка, глухая кукушка, трехпалый дятел, на пролете встречается дербник. Кроме того, здесь гнездятся большая выпь, полевой и луговой луни, перепел, коростель, юла, лесная завирушка, крапивник, садовая овсянка, дубровник - виды, нуждающиеся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Нижегородской области (приложение 2 к Красной книге Нижегородской области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные рубки леса, лесные пожары, сокращение сельскохозяйственных площадей, фактор беспокойства, браконьерство.

Памятник природы «Озеро Моховое» занимает много меньше 1% площади. Спроектирован и зарезервирован комплексный заказник «Журавлиный», который обеспечит сохранение КОТР.

15. Килемарский заказник (НГ-006)

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР расположена востоке Воскресенского и юго-западе Шарангского районов и занимает 556,6 км². Схема территории показана на рисунке 16.

Территория представляет собой типичный участок южной тайги. Включает наиболее крупные в Нижегородской области не затронутые рубками массивы плакорных пихтово-еловых лесов с дубравными элементами, участки первичной растительности бореальной поймы (древостой образуют ель, дуб, пихта, ольха черная, фрагменты пойменных лугов), небольшие участки высоковозрастных сосновых боров, восстанавливающиеся на вырубках разных лет производные березняки, осинники, сосняки.




Рис. 16. Схема КОТР «Килемарский заказник»

Леса занимают 99% площади (из них высоковозрастные плакорные пихтово-еловые леса с дубравными элементами - 20%, высоковозрастные сосновые боры - 2%, высоковозрастные пойменные леса - 3%, молодые сосняки - 6%, молодые березняки, осинники, вырубки - 68%), пойменные луга - 1%. Этот лесной массив - одно из наиболее значимых ядер экологического каркаса Нижегородской области.

КОТР служит местом произрастания венерина башмачка настоящего и лобарии легочной, местом обитания мнemoзины (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: выдры, рыжей вечерницы, лесного нетопыря, ночниц Брандта, прудовой и водяной, северного кожанка, обыкновенной гадюки, сибирского углозуба, махаона, подалирия, лунника оживающего, цепербиты уральской, зеленчука желтого, воронца красноплодного, рдестов длиннейшего и Фриса, лютика Кауфмана, нимфейника щитовидного.

Вся территория относится к государственному лесному фонду Воскресенского и Шарангского лесхозов. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. На лесных полянах, занимающих менее 1% территории, ведется сенокосение.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 14.

Таблица 14

Орнитологическая характеристика КОТР «Килемарский заказник»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Скопа	нерег. гн.	0-1 пара	D1
Осоед	гн.	10-15 пар	-
Черный коршун	гн.	5-6 пар	-
Луговой лунь	гн.	3-6 пар	-
Болотный лунь	гн.	1-2 пары	-
Сапсан	гн.	1 пара	D1
Рябчик	гн.	300-1000 выводков	-
Перепел	гн.	15-20 токующих самцов	-
Тетерев	гн.	?	-
Глухарь	гн.	?	-
Серый журавль	гн.	5-7 территориальных пар	
Коростель	гн.	20-30 пар	A1
Фиф и	пр., гн.?	?	-
Обыкновенная кукушка	гн.	2000-2600 токующих самцов	-
Глухая кукушка	гн.	100-150 токующих самцов	D2
Обыкновенный козодой	гн.	800-1000 пар	-
Филин	гн.	1-3 пары	D1
Болотная сова	гн.	3-5 пар	-
Длиннохвостая неясыть	гн.	15-25 пар	-
Мохноногий сыч	гн.	?	-
Воробьиный сыч	гн.	?	-
Желна	гн.	30-60 пар	-
Трехпалый дятел	гн.	?	-
Седой дятел	гн.	?	-
Вьюрок	гн.	?	-
Черный дрозд	гн.	600-800 пар	-
Деряба	гн.	300-500 пар	-
Певчий дрозд	гн.	800-1000 пар	B3
Речной сверчок	гн.	800-1000 пар	B3
Лесной жаворонок	гн.	300-500 пар	B2

Браконьерство представляет небольшую угрозу для данной территории, существует потенциальная угроза выборочных и сплошных рубок леса.

Около 66% площади КОТР охраняется в пределах Килемарского государственного природного комплексного заказника.

16. Водоем с колонией озерных чаек в с. Заболотное

Статус КОТР - областной.

КОТР находится на юго-западе Сокольского района, на северо-западной окраине с. Заболотное и занимает 0,24 км². Схема территории показана на рисунке 17.

Особую ценность для птиц представляет низинное осоковое болото (8,3 га). На его восточном и южном берегах располагаются жилые дома и хозяйственные постройки; на западном и северном - луг-щучник, используемый в качестве пастбища. Древостой на болоте отсутствует; по окраине встречаются отдельные экземпляры ивы пепельной и рябины обыкновенной. Преобладает ассоциация с доминированием осоки омской, на отдельных небольших участках представлена ассоциация с преобладанием хвоща приречного. Осока омская образует кочки высотой до 0,5 м и диаметром 0,3-0,6 м; они занимают около 80 % площади болота. Между кочками - вода глубиной 0,2-0,5 м. Местами на болоте имеются окна открытой воды, занимающие 10-15 % его площади. В этих местах глубина водоема достигает 1,0-1,5 м.

КОТР расположена на землях Заболотновской сельской администрации.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 15.




Рис. 17. Схема КОТР «Водоем с колонией чаек в с. Заболотное»

Таблица 15

Орнитологическая характеристика КОТР «Водоем с колонией озерных чаек в с. Заболотное»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чирок-свистунок	гн.	2-4 выводка	-
Широконоска	гн.	1 выводок	-
Камышница	гн.	1-2 пары	-
Фифи	лет.	единично	-
Озерная чайка	гн.	1300 пар (в 1980-84 гг. - до 7000 пар)	D3
Сизая чайка	гн.	1 пара	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР: численность озерных чаек, как и везде в Нижегородской области, падает по неизвестным причинам.

Болото, служащее местом гнездования околоводных и водоплавающих птиц (35% КОТР) взято под охрану в качестве памятника природы "Водоем с колонией озерных чаек в с. Заболотное".

17. Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в основном в Сокольском районе возле его южной границы, небольшим участком заходит в Городецкий район. Площадь КОТР - 42,61 км². Схема территории показана на рисунке 18.

КОТР включает участок берега и примыкающую акваторию Горьковского водохранилища. На берегу на песчаных почвах представлены типичные разновозрастные сосновые боры - черничники, кисличники, вейниковые и орляковые. Старовозрастные сосняки сконцентрированы в основном в северной части территории.




Рис. 18. Схема КОТР «Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики»

Лесные земли занимают около 60% территории и относятся к государственному лесному фонду Сокольского лесхоза. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Акватория Горьковского водохранилища занимает около 40% площади.

Колония серых цапель расположена на полуострове на левом берегу Горьковского водохранилища около устья р. Мича. Полуостров имеет длину 1 км и ширину 300-370 м, основную его часть занимают боры черничники и кисличники в возрасте около 100 лет.

Численность серой цапли: в 1995 г. - 230 пар; в 1997 г. - 223 пары, в 2001 г. - 334 пары; на КОТР гнездится более 10% от областной численности вида (критерий D2). На территории регулярно держится 1-2 летующих орлана-белохвоста, возможно гнездование. Во время пролета здесь скапливается значительное число водоплавающих и околоводных птиц, их численность нуждается в дополнительном изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, браконьерство, сплошные и выборочные рубки леса.

Около 9,5% площади КОТР взято под охрану в качестве памятника природы "Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики".

18. Массив сосновых лесов в Бриляковском лесничестве




Рис. 19. Схема КОТР «Массив сосновых лесов в Бриляковском лесничестве»

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в северной части Городецкого района и занимает 13,91 км². Схема территории показана на рисунке 19.

КОТР включает массив высоковозрастных и средневозрастных сосновых лесов. Они служат местом произрастания осиновика белого, занесенного в Красные книги РФ и Нижегородской области. Леса относятся к государственному лесному фонду Городецкого лесхоза. В них (за исключением ООПТ) ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством.

Территория служит местом гнездования бородатой неясыти (1 пара - критерий D2).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, браконьерство.

Около 56% площади КОТР взято под охрану в качестве памятника природы "Участок сосновых лесов в Бриляковском лесничестве".

19. Массивы верховых и переходных болот в среднем течении р. Керженец

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в юго-восточной части Семеновского района, небольшая часть заходит в Воскресенский район. Площадь КОТР - 426,07 км². Схема территории показана на рисунке 20.

Территория включает крупные верховые и переходные болота, перемежающиеся с хвойно-широколиственными (в т.ч. высоковозрастными), сосновыми и мелколиственными лесами, а также участок сельскохозяйственных угодий.

КОТР служит местом обитания мнемозины и произрастания пальчатокоренника Траунштейнера (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, орденских лент неверной и малой красной, подалирия, шмелей Шренка и мохового, осоки малозеленой, печеночницы благородной.

Лесные земли занимают 92% территории и относятся к государственному лесному фонду Семеновского и Воскресенского лесхозов, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Семеновский межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Одним из основных источников доходов населения примыкающих территорий являются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах КОТР. Сельхозугодья занимают около 8% площади, используются для выращивания зерновых, а также в качестве пастбищ и сенокосов, значительная часть представляет собой зарастающие лесом залежи. Земли сельских населенных пунктов занимают менее 1% территории.




Рис. 20. Схема КОТР «Массив верховых и переходных болот в среднем течении р. Керженец»

Территория выделена по критерию D2 как важное место гнездования (46 территориальных пар) и предотлетного скопления (около 100 особей) серых журавлей. Здесь также отмечено гнездование седого и трехпалого дятлов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. Орнитологическая значимость территории изучена недостаточно, и ее статус может оказаться выше областного.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, весенняя охота, браконьерство, фактор беспокойства.

Болота в основном взяты под охрану (охраняется около 15% площади КОТР). Создано 5 памятников природы ("Болото Большое Клушинское", "Болото Долгое", "Болото Калган", "Болото Келейное-Кривое", "Болота Ямное, Ягодное, Бутино"), на участках нуждающихся в охране лесов спроектированы и зарезервированы еще 5 памятников природы ("Болото Песочное 1", "Прикерженские ельники и дубравы у д. Мериново", "Прикерженские леса ниже д. Взвоз", "Прикерженские леса у с. Хахалы", "Участки высоковозрастных лесов по рекам Большой и Малый Ухтыш"), после организации которых под охраной окажется 25% территории, включая все важные для птиц местообитания.

20. Территория между д. Ковригино и г. Городец

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в центральной части Городецкого района, примыкает с севера к г. Городец и занимает 22,19 км². Схема территории показана на рисунке 21.

Территория представляет собой поля и залежи, перемежающиеся с небольшими производными лесами, заболоченностями и водоемами выработанных торфяных месторождений. Одно из важнейших для птиц местообитаний - Гороховское болото — водоем выработанного торфяного месторождения площадью 19 га. Преобладающая глубина - около 1 м. Вдоль берегов тянется пояс прибрежной растительности шириной 10-50 м, в котором доминируют veinик сероватый и пепельно-серая. Основную часть водоема занимают заросли розга широколистного, который образует ассоциации либо чистые, либо с другими видами прибрежно-водных растений.




Рис. 21. Схема КОТР «Территория между д. Ковригино и г. Городец»


Среди зарослей рогаза располагаются окна открытой воды, часто окаймленные высокими кочками осоки омовой. В восточной и северо-восточной частях карьера расположены участки, где восстанавливается низинное березово-осокое болото.

Лесные земли занимают около 5% территории и относятся к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Городецкий межхозяйственный лесхоз. В лесах ведутся рубки главного и промежуточного пользования. Основную территорию занимают сельхозугодья: поля зерновых и картофеля, залежи, сенокосы и пастбища. Земли сельских населенных пунктов занимают около 1% площади.

На Гороховском болоте расположена крупная колония чайковых. Здесь гнездится около 3000 пар озерных чаек (критерий D3) и 10 пар сизых чаек. Территория служит местом остановки гусей на пролете (одновременно не менее 500 особей - критерий D4). На поле возле Гороховского болота отмечена пара куликов-сорок (Красная книга РФ).

Угрозы деградации данной территории как КОТР нуждаются в дополнительном изучении.

Территориальной охраны нет.



21. Чашковское болото

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в центральной части Городецкого района и занимает 2,29 км². От с. Смольки 1 км на юго-восток, от д. Яблонное (Смольковской сельской администрации) на восток 0,5 км. Схема территории показана на рисунке 22.

Важнейшее местообитание птиц - водоем выработанного торфяного месторождения (17 га) на месте бывшего Чашковского болота.

КОТР расположена на землях совхоза «Земледелец».

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 16.

Рис. 22. Схема КОТР «Чашковское болото»

Таблица 16

Орнитологическая характеристика КОТР «Чашковское болото»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	2-3 пары	-
Черношейная поганка	гн.	до 6 пар	D2
Серощекая поганка	гн.	1 пара	D2
Кряква	гн.	3-5 выводков	-
Шилохвость	гн.	до 3 выводков	D2
Широконоска	гн.	до 3 выводков	-
Связь	лет.	0-3 особи	-
Гоголь	лет.	единицы особей	-
Чирок-трескунок	гн.	1-3 выводка	-
Чирок-свистунок	гн.	1-3 выводка	-
Хохлатая чернеть	гн.	3-4 выводка	-
Болотный лунь	гн.	1-2 пары	-
Камышница	гн.	1-2 пары	-
Перевозчик	гн.	1-2 пары	-
Турухтан	пр.	десятки особей	-
Озерная чайка	гн.	800-1500 пар	D3
Сизая чайка	гн.	60-100 пар	-
Серебристая чайка	гн.	19 пар	D2
Речная крачка	гн.	2 пары	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, браконьерство.

Около 18% площади КОТР взято под охрану в качестве памятника природы "Водоем с колонией чаек у с. Смольки".

22. Русло и пойма р. Волги от г. Городец до г. Н.Новгород

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР представляет собой участок русла и поймы р. Волги от плотины Горьковской ГЭС до устья р. Оки (Городецкий, Балахнинский, Борский районы и г. Н. Новгород). Площадь КОТР - 242,01 км². Схема территории показана на рисунке 23.

КОТР включает последний сохранившийся участок незарегулированного русла р. Волги с песчаными островами и песчаными пляжами по берегам, а также территорию поймы, где чередуются пойменные дубравы, черноольшанники, заливные луга, водоемы.

Лесные земли занимают около 40% территории и относятся к государственному лесному фонду Городецкого и Борского лесхозов, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Борский и Городецкий межхозяйственные лесхозы. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают около 44% площади, используются как сенокосы и пастбища. Русло р. Волга занимает около 16% площади.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 17.




Рис. 23. Схема КОТР «Русло и пойма р. Волги от г. Городец до г. Н.Новгород»

Таблица 17

Орнитологическая характеристика КОТР «Русло и пойма р. Волги от г. Городец до г. Н.Новгород»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Кулик-сорока	гн.	5-10 пар	D1 (C1?)
Озерная чайка	гн.	250 пар	D3
Сизая чайка	гн.	7 пар	-
Речная крачка	гн.	190 пар	D2
Малая крачка	гн.	110-115 пар	B2
Серая цапля	гн.	150-160 пар	D2
Малая чайка	вер. гн.*	90-110 пар	B2
Черная крачка	вер. гн.*	150-170 пар	D2
Белокрылая крачка	вер. гн.*	5-10 пар	D2
Черноголовый хохотун	лет.	до 40 особей	D1

* Колония малых чаек, черной и белокрылых крачек не найдена, предположительная численность определена по результатам наблюдений за кормящимися и отдыхающими птицами.

КОТР будет уничтожена в случае подъем уровня Чебоксарского водохранилища выше существующей отметки 63 м, а также в случае строительства Балахнинского низконапорного гидроузла. Угрозу для птиц представляют весенняя охота, браконьерства и фактор беспокойства.

Большая часть поймы (около 21% площади КОТР) взято под охрану в качестве памятника природы «Дубрава у г. Городца».



Рис. 24. Схема КОТР «Зиняковские пруды»

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в юго-восточной части Городецкого района, примыкает с востока к с. Зиняки и с юга к д. Чуркино, занимает 5,78 км². Схема территории показана на рисунке 24.

Территория включает систему из двух прудов площадью около 30 га с постоянным гидрологическим режимом, небольшой водоем у автодороги Н.Новгород - Городец, а также окружающие их пастбища, сенокосы и залежи.

КОТР расположена на землях АО «Зиняковское».

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 18.

Таблица 18

Орнитологическая характеристика КОТР «Зиняковский пруд»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	3 пары	-
Серая цапля	кормятся	1-2 особи	-
Большая выпь	гн.	2 пары	-
Чирок-тескунок	гн.	5-9 выводков	-
Чирок-свиистунок	гн.	1 выводок	-
Широконоска	гн.	1-2 выводка	-
Красноголовый нырок	гн.	3-5 выводков	-
Обыкновенный гоголь	лет.	2 особи	-
Хохлатая чернеть	гн.	7-8 выводков	-
Болотный лунь	гн.	1 пара	-
Камышница	гн.	1-2 пары	-
Турухтан	пр.	50-100 особей	-
Большой кроншнеп	гн.	1-2 пары	-
Большой веретенник	пр.	16 особей	-
Фифи	пр.	10 особей	-
Мородунка	пр.	1 особь	-
Кулик-воробей	пр.	2 особей	-
Большой улит	пр.	1 особь	-
Белокрылая крачка	гн.	80-90 пар	D2
Черная крачка	гн.	25-30 пар	D2
Речная крачка	гн.	5-6 пар	-
Сизая чайка	гн.	1 пара	-
Озерная чайка	гн.	150-170 пар	D3
Дроздовидная камышевка	гн.	?	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР: спуск прудов в результате старения и разрушения гидротехнических сооружений. Возможен ущерб от весенней охоты и браконьерства.

Территориальной охраны нет. Необходимые меры охраны: после дополнительного обследования присвоение статуса территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. Здесь установлено гнездование около 7,7 % от числа белокрылых крачек и 1,8 % от числа черных крачек, обитающих в Нижегородской области.

24. Видуновское болото

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на юго-восточной границе Городецкого района, незначительная часть находится в Борском районе. Площадь КОТР - 24,07 км². Схема территории показана на рис. 25.

КОТР представляет собой водоем выработанного торфяного месторождения с крупной колонией чаек (Видуновское болото) и окружающие сельхозугодья с многочисленными заболоченностями. Видуновское болото - мелководный (глубина до 1 м) водоем площадью 0,22 км², сильно заросший прибрежно-водной растительностью со следами разработки торфа и мелиорации. Вдоль берега тянется широкий (от 5 до 30 м) пояс прибрежно-водных растений, где доминирует осока омовая. Местами встречаются заросли ив пепельной, мирзинолистной, пятипятичичиновой и розмаринолистной. У северного берега - участок с растительностью низинного березово-осокowego болота. Второй пояс прибрежно-водной растительности занимает мелководья с глубинами 0,3-0,5 м. Вдоль южного берега он сплошной, у других берегов - прерывистый. Ширина этого пояса - от 10 до 100 м. В данном поясе представлены ассоциации рогоза широколистного, тростника обыкновенного и белокрыльника болотного. Центральную часть водоема занимает сплавина, заросшая осоками волосистоплодной, вздутой и омовой; встречаются единичные кусты ивы пепельной, куртины рогоза широколистного и белокрыльника болотного. В целом сплавины и заросли прибрежно-водных растений занимают около 70 % площади водоема.




Рис. 25. Схема КОТР «Видуновское болото»

Лесные земли КОТР занимают около 25% и относятся к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Борский и Городецкий межхозяйственные лесхозы. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Также около 25% площади занимают заболоченности и выработанные торфяные месторождения; земли населенных пунктов - около 1%. Остальная часть территории приходится на сельхозугодья, которые частично используются для выращивания зерновых и картофеля, а также в качестве сенокосов и пастбищ; многие участки представляют собой зарастающие лесом залежи. КОТР расположена на землях АОЗТ «Зиняковское».

На Видуновском болоте гнездится около 9% от числа озерных чаек, обитающих в Нижегородской области. Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 19.

Таблица 19
Орнитологическая характеристика Видуновского болота

Угрозы деградации данной территории как КОТР нуждаются в уточнении. Ущерб может наносить весенняя охота. Существует потенциальная угроза осушительной мелиорации и интенсификации сельского хозяйства.

Территориальной охраны нет.

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Болотный лунь	гн.	1-2 пары	-
Камышница	гн.	1-2 пары	-
Чирок-трескунок	гн.	2-4 выводка	-
Чирок-свиристель	гн.	1 выводок	-
Кряква	гн.	1-3 выводка	-
Широконоска	гн.	1-2 выводка	-
Озерная чайка	гн.	2500-3000 пар	D3
Сизая чайка	гн.	3-5 пар	-

25. Ситниковские торфокарьеры (НГ-002) RU185

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена в Борском районе и занимает 47,45 км². От г. Бор к северу 5 км, при р.п. Ситники с севера. Схема территории показана на рис. 26.

КОТР представляет собой крупную систему водоемов выработанных торфяных месторождений разного типа и возраста на месте переходных и низинных болот, разработанных способами гидроразмыва и фрезерным. Имеются небольшие участки неразработанных и восстановившихся после торфоразработок низинных и переходных болот.

Водоемы выработанных торфяных месторождений занимают 60% площади, сплавины - 5 %, неразработанные и восстановившиеся низинные и переходные болота - 15 %, производные березняки на месте вырубок и осушенных болот - 20 %. Водоемы имеют неодинаковую глубину и разный характер растительности, поэтому каждый из них является более или менее благоприятным для гнездования разных видов водоплавающих и околоводных птиц.

КОТР расположена на землях Ситниковской сельской администрации и МУСП «Пригородное». На территории ведутся выборочные рубки леса на дрова, охотничье хозяйство (осенняя охота), любительское рыболовство.

На Ситниковских карьерах существует крупнейшее в Нижегородской области поселение чайковых птиц, в котором численность гнездящихся сизых чаек составляет более 2% европейской популяции вида, численность гнездящихся озерных чаек в начале 1980-х годов доходила до 1% европейской популяции вида. Гнездятся с высокой плотностью другие виды водоплавающих и околоводных птиц. Общая численность водоплавающих и околоводных птиц в гнездовой период составляет от 24000 (только взрослые особи) до 44000 (с учетом поднявшихся на крыло молодых), что соответствует критерию А4.3. Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 20.

Динамика численности чайковых с 1982 г. по 2002 г.:
* - неуклонное сокращение, ** - постоянный рост, *** - флуктуация по годам.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: изменения существующего гидрологического режима территории, в том числе обмеление водоемов в результате незаконного забора воды для полива садов; старение и зарастание водоемов; пожары; браконьерство, в том числе сбор яиц чайковых, фактор беспокойства.

Охраняется около 44% площади КОТР (Ситниковский орнитологический заказник). Целесообразно расширение территории заказника до границ КОТР.




Рис. 26. Схема КОТР «Ситниковские торфокарьеры»

Орнитологическая характеристика КОТР «Ситниковские торфокарьеры»

Таблица 20

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Большая выпь	гн.	100 пар	D2
Малая выпь	гн.	5-10 пар	D2
Черношейная поганка	гн.	10 пар	D2
Красношейная поганка	гн.	2 пар	D2
Чомга	гн.	5 пар	D2
Кряква	гн.	50 выводков	-
Свиязь	гн.	15 выводков	D2
Шилохвость	гн.	6 выводков	D2
Широконоска	гн.	30 выводков	D2
Чирок-трескунок	гн.	100 выводков	D4
Чирок-свиистунок	гн.	20 выводков	-
Красноголовый нырок	гн.	20 выводков	D4
Хохлатая чернеть	гн.	55 выводков	D4
Обыкновенный гоголь	гн.	1-2 выводка	-
Болотный лунь	гн.	7 пар	-
Черный коршун	гн.	1-2 пары	-
Сапсан	пр., нерег. лет.	0-2 особи	-
Погоныш	гн.	100 пар	B3
Малый погоныш	гн.	10 пар	D2
Камышница	гн.	20 пар	D4
Чибис	гн.	25 пар	-
Большой улит	гн.	3 пары	-
Фиф и	гн.	3 пары	-
Травник	гн.	6 пар	-
Черныш	гн.	5 пар	-
Перевозчик	гн.	3 пары	-
Бекас	гн.	20 пар	-
Большой кроншнеп	гн.	0-2 пары	-
Большой веретенник	гн.	1-2 пары	-
Мордунка	гн.	1-2 пары	-
Озерная чайка	гн.	3000-22000 пар*	A4.1
Серебристая чайка	гн.	3-170 пар**	D2
Сизая чайка	гн.	7000-10000 пар***	A4.1
Малая чайка	возм. гн.	до 10 пар	D2?
Речная крачка	гн.	100-500 пар*	D2
Черная крачка	возм. гн.	менее 10 пар	-
Белокрылая крачка	возм. гн.	менее 10 пар	-
Дроздовидная камышевка	гн.	10 пар	-
Обыкновенный сверчок	гн.	10 пар	-

26. Пойма и русло р. Волги от г. Н.Новгорода до п. Память Парижской Коммуны

Статус КОТР – международный (европейский).

КОТР вытянута вдоль южной границы Борского и северной границы Кстовского районов и занимает 133,07 км². Схема территории показана на рис. 27.

КОТР включает участок русла р. Волги с сохранившимися островами и песчаными пляжами, крупные массивы пойменных лугов с небольшими лесными участками.

Лесные земли занимают около 10% территории и относятся к государственному лесному фонду Борского лесхоза и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Борский межхозяйственный лесхоз. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Русло р. Волга – около 33% площади. Остальную территорию занимают сельскохозяйственные угодья, используемые в качестве сенокосов и пастбищ.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 21.




Рис. 27. Схема КОТР «Пойма и русло р. Волги от г. Н.Новгорода до п. Память Парижской Коммуны»

Таблица 21

Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма и русло р. Волги от г. Н.Новгорода до п. Память Парижской Коммуны»

Основную угрозу для наземно гнездящихся колониальных околотовдных птиц представляют резкие перепады уровня воды в Чебоксарском водохранилище, производимые в мае-июне, а также фактор беспокойства. В случае подъема уровня Чебоксарского водохранилища выше современной отметки 63 м территория утратит свое значение.


Территориальной охраны нет.

27. Болотный массив в правобережье среднего течения р. Керженец

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на границе Борского и Семеновского районов и занимает 163,75 км². Схема территории показана на рис. 28.

Территория представляет собой верховые, переходные и низинные болота (болото Большое Керженское частично разработано фрезерным способом), перемежающиеся с разновозрастными мелколиственными и сосновыми лесами.



Лесные земли занимают всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Борского и Семеновского лесхозов. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством.

Болота служат одним из важных для Нижегородской области мест гнездования серого журавля (33 территориальные пары - критерий D2).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: возобновление разработок торфа, прекратившихся в конце 1990-х гг., рубки главного пользования в водоохраных зонах болот.

Керженский охотничий заказник занимает около 38% КОТР. Спроектирован и зарезервирован памятник природы «Болото Узкое-Ягодное», занимающий около 10% КОТР.

Рис. 28. Схема КОТР «Болотный массив в Правобережье среднего течения р. Керженец»

28. Массив лесов и болот по р. Нюжма и примыкающий участок поймы р. Волги

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР расположена на стыке Борского, Кстовского и Лысковского районов. Основная часть территории находится в Борском районе. Площадь КОТР - 155,89 км². Схема территории показана на рисунке 29.

КОТР включает участок русла и поймы р. Волги, а также левобережные надпойменные террасы, где расположен массив разновозрастных сосновых лесов с крупными низинными и переходными болотами.

Лесные земли занимают около 80% территории и относятся к государственному лесному фонду Затонского лесхоза. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают около 4% площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ. Русло р. Волга занимает около 15% площади, земли населенных пунктов - около 1% площади.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 22.




Рис. 29. Схема КОТР «Массив лесов и болот по р. Нюжма и примыкающий участок поймы р. Волги»

Орнитологическая характеристика КОТР «Массив лесов и болот по р. Нюжма и примыкающий участок поймы р. Волги»

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, перепады уровня воды в Чебоксарском водохранилище, производимые в мае-июне, фактор беспокойства, а также возможный подъем уровня Чебоксарского водохранилища выше современной отметки 63 м.

Охраняется около 8% площади КОТР (памятник природы «Болото Нюжемское-1»). На большей части КОТР спроектирован и зарезервирован Нюжемский заказник.

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая цапля	гн.	20-25 пар	D2
Скопа	вер. гн.	1 пара	D1
Орлан-белохвост	вер. гн.	1 пара	D1
Большой подорлик	вер. гн.	1 пара	D1
Малая чайка	гн.	до 10 пар	-
Речная крачка	гн.	30-100 пар	D2
Малая крачка	гн.	15-70 пар	B2
Черная крачка	гн.	до 25 пар	D2

29. Камско-Бакалдинские болота (НГ-001) RU184

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР занимает северную (заволжскую) часть Лысковского и Воротынского районов, а также прилегающие территории Борского, Семеновского и Воскресенского районов. Площадь КОТР - 3159,85 км². Схема территории показана на рисунке 30.




Рис. 30. Схема КОТР «Камско-Бакалдинские болота»

Камско-Бакалдинские болота - крупнейший в бассейне р. Волги сохранившийся в естественном состоянии массив верховых, переходных и низинных болот. Общая площадь разведанных торфяных месторождений составляет около 70 тыс. га. Большая часть болот здесь переходные, среди них имеются как открытые осоково-сфагновые, пушицево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые, так и облесенные с древостоем из низкорослой сосны и березы, встречаются верховые болота с древостоем из низкорослой сосны. В поймах малых рек, по окраинам верховых и переходных болот небольшие участки занимают низинные болота - облесенные (березовые и черноольховые) и открытые (тростниковые и осоковые). 2000 га болот разработаны фрезерным способом. Среди болот расположены 27 озер эолового происхождения, множество малых рек и ручьев. Большую часть территории между болотами занимают 15-50-летние березняки и осинники на месте вырубок и гарей, не тронутые рубками боры в возрасте 100-120 лет сохранились только в виде небольших грив среди наименее доступных для людей и техники болот. КОТР включает участок Чебоксарского водохранилища.

Основные типы местообитаний, распространенных на территории: сосновые леса - 38 %; вторичные смешанные и мелколиственные леса - 30 %; пресноводные озера - 1 %; акватория Чебоксарского водохранилища - 5 %, верховые, переходные и низинные болота - 23 %, пашни - 1 %, залежи - 1 %, населенные пункты - 1 %.

КОТР служит местом обитания животных и произрастания растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ: аполлона, мнемозины, пальчатокоренника Траунштейнера, пыльцеголовника красного, неоттианте клубучковой, гирипоров каштанового и синего, ежевика коралловидного, осиновика белого, паутинника фиолетового, лобарии легочной, местом обитания животных и произрастания растений и грибов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенного ушана, ночниц Брандта и прудовой, рыжей вечерницы, двухцветного кожана, лесного нетопыря, выдры, лесной сони, обыкновенной гадюки, обыкновенной медянки, языка обыкновенного, подалирия, махаона, малого ночного павлиньего глаза, орденских лент малиновой и розовой, переливницы большой, шмелей байкальского, мохового, пластинозубого, Шренка, древоточца блестящего, лесного муравья волосистого, муравья-амазонки, веслоногого рачка Гетерокопе, ветвистоусого рачка Голопедиум, паука-охотника, березы приземистой, ежеголовников Фриса и узколистного, гроздовников многораздельного и полулунного, ив лапландской и черниковидной, клюквы мелкоплодной, ладьяна трехнадрезного, леерсии рисовидной, молодила побегоносного, осок двудомной, малочетковой и струнокорневой, тайника сердцевидного, мытника скипетровидного, рдестов волосовидного и длиннейшего, росянки английской, печеночницы благородной, манника литовского, подмаренника трехцветкового, баранца обыкновенного, ликоподиеллы заливаемой, менегации пробурвленной.

Земли особо охраняемых природных территорий (Керженский заповедник) занимают около 15% территории. Земли лесного фонда занимают 77% территории и относятся к государственному лесному фонду Семеновского, Воскресенского, Затонского, Лысковского и Михайловского лесхозов, а также к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенным в Борский межхозяйственный лесхоз и не объединенным в межхозяйственные лесхозы в Лысковском и Ворытинском районах. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки леса, намеченные лесоустройством. Акватория Чебоксарского водохранилища занимает 5 % площади, сельхозугодья (пашня, залежи, сенокосы, пастбища) - около 2%, земли населенных пунктов - около 1%.

Имеющаяся информация о численности видов птиц, соответствующей критериям выделения КОТР разной значимости представлена в таблице 23.

КОТР имеет всемирное значение по критерию А3: на ней гнездятся 6 видов, распространение которых ограничено таежным биомом (красношейная поганка, луток, большой улит, бородастая неясыть, вьюрок, овсянка-ремез).

В последние годы наблюдается рост (восстановление оптимального уровня) численности редких видов хищных птиц благодаря проведенным биотехническим мероприятиям. Численность серого журавля стабилизировалась после периода роста в 1980-х-90-х гг. В 2003 г. отмечено значительное (в 3-4 раза по сравнению с 1988 г.) сокращение численности большого кроншнепа. Причины сокращения численности неизвестны и, очевидно, не связаны с состоянием КОТР. В 2003 г. впервые для Нижегородской области установлено гнездование среднего кроншнепа (на территории Керженского заповедника). Помимо важного значения для многих редких гнездящихся видов птиц, Камско-Бакалдинские болота служат местом остановок на пролете водоплавающих и околоводных птиц, однако точные данные по учету численности птиц на пролете отсутствуют.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: высокая степень угрозы - выборочная рубка леса, развитие инфраструктуры территории; средняя степень угрозы - сплошная рубка леса, рекреационная нагрузка, фактор беспокойства, лесные пожары.

Разные показатели состояния КОТР демонстрируют признаки как улучшения, так и ухудшения ситуации; в перспективе возможно значительное ухудшение вследствие роста рекреационной нагрузки.

В настоящее время наибольшую угрозу представляют сплошные и выборочные рубки леса в водоохранных зонах болот (в том числе санитарные рубки в охранных зонах памятников природы), а также лесные пожары. В связи с недостаточным бюджетным финансированием лесхозов они вынуждены зарабатывать собственные средства продажей древесины от рубок промежуточного пользования. Этот же дефицит средств не позволяет лесхозам проводить на достаточном высоком уровне оперативное выявление и тушение очагов возгорания.

Торфопредприятие «Камское» в настоящее время существует, но разработки торфа не ведутся. Ранее разработанная и освоенная площадь (2770 га) не увеличилась. Вероятность возобновления добычи торфа невелика.

Важнейшим негативным фактором в ближайшей перспективе может стать высокая рекреационная нагрузка. Доступность и посещаемость территории быстро возрастают в связи со строительством новых асфальтированных дорог. Увеличения посещаемости приводит к росту числа возгораний и случаев браконьерства, а также усилению влияния фактора беспокойства на гнездящихся птиц.

**Характеристика орнитологической значимости КОТР
«Камско-Бакалдинские болота»**

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения
Европейская чернозобая гагара	гн.	3-4 пары	C1
Чомга	гн.	35-40 пар	D2
Красношейная поганка	гн.	3-4 пары	D2
Черношейная поганка	гн.	3-S пары	D2
Серая цапля	гн.	650-700 пар	D2
Лебедь-шипун	гн.	1-2 пары	D2
Кряква	гн.	200-300 выводков	D4
Шилохвость	гн.	3-10 выводков	D2
Широконоска	гн.	20-40 выводков	D2
Чирок-свистунок	гн.	300-500 выводков	D4
Чирок-трескунок	гн.	100-200 выводков	D4
Связь	гн.	50-100 выводков	D2
Луток	гн.	5-10 пар	D2
Красноголовый нырок	гн.	20-25 выводков	D4
Хохлатая чернеть	гн.	50-100 выводков	D4
Белоглазый нырок	нерег. лет.	1-2 особи	D1
Обыкновенный гоголь	гн.	100-300 выводков	D2
Водоплавающие и околоводные птицы (общая численность гусеобразных, ржанкообразных, журавлеобразных)	гн. (май-июнь)	15000 взрослых особей	A4.3
	гн. (июль-август)	50000 взрослых и молодых особей	
Скопа	гн.	12-15 пар	C1
Беркут	гн.	9-10 пар	B2
Большой подорлик	гн.	2-3 пары	A1
Орел-карлик	вер.гн.	0-1 пара	D2
Орлан-белохвост	гн.	4-5 пар	A1
Змееяд	вер.гн.	2-3 пары	D1
Сапсан	гн.	1-2 пары	D1
Кобчик	гн.	2-3 пары	D2
Дербник	гн.	1-2 пары	D2
Тетерев	гн.	4600-5000 особей	B2
Серый журавль	гн.	420-470 территориальных пар	B1.1
Лысуха	гн.	5-10 пар	D2
Дупель	гн.	20-50 токующих самцов	A1
Кулик-сорока	гн.	5-10 пар	D1
Большой кроншнеп	гн.	300-900 пар	C1
Средний кроншнеп	гн.	минимум 1 пара	D2
Большой веретенник	гн.	100-300 пар	B2
Большой улит	гн.	500-1000 пар	A4.1
Фифи	гн.	100-200 пар	D2
Мородунка	гн.	20-50 пар	D2
Травник	гн.	40-80 пар	D2
Сизая чайка	гн.	460-550 пар	D3
Серебристая чайка	гн.	10-15 пар	D2
Речная крачка	гн.	1000-1050 пар	D2
Малая крачка	гн.	60-70 пар	B2
Черная крачка	гн.	100-150 пар	D2
Клингх	гн.	не менее 8 пар	D2
Глухая кукушка	гн.	10-20 то кующих самцов	D2
Бородатая неясыть	гн.	1-2 пары	A3
Филин	гн.	5-7 пар	D1
Сизоворонка	гн.	5-10 пар	D2
Лесной жаворонок	гн.	1500-1800 пар	B2
Обыкновенная горихвостка	гн.	10000-11000 пар	B2
Обыкновенный соловей	гн.	1800-2000 пар	B3
Певчий дрозд	гн.	1000-1100 пар	B3
Деряба	гн.	3000-3500 пар	B3
Мухоловка-пеструшка	гн.	10000-12000 пар	B3

Возможный подъем уровня Чебоксарского водохранилища с существующей отметки 63 м до отметки 65 м или 68 м приведет к значительному нарушению гидрологического режима территории, результатом чего станут усыхание участков леса вследствие подтопления, перестройка болотных и водных экосистем. Будет утрачено эталонное значение болотных экосистем, произойдет сокращение численности или исчезновение многих локальных популяций редких видов живых организмов.

Камско-Бакалдинская группа болот включена в список водно-болотных угодий (ВБУ), имеющих международное значение в соответствии с Рамсарской конвенцией. На КОТР создан государственный природный биосферный заповедник (ГПБЗ) «Керженский» (467,86 км²), 17 памятников природы общей площадью вместе с охранными зонами 877,22 км² («Озеро Красное», «Озеро Малое Плотово», «Озеро Рыжан», «Болото Светлое», «Озеро Светлое», «Болото Дерябинское и оз. Дерябино», «Болото Бакалдинское», «Болото Рябиновское с озером Рябиновским», «Болото Слоновско-Курмановское с озером М. Культей», «Озеро Б.Культей», «Болото Большое П-Пальники», «Болото Плотовское с озером Б. Плотово», «Болото Камское-Осиновые Котлы», «Болото Дряничное», «Пойменная дубрава у д. Пенякша», «Участок соснового леса с молодилом побегоносным у с. Макарьево», «Географические лесные культуры М.Г.Здорика») спроектирован и зарезервирован природный комплексный заказник «Ламненский». Всего охраняется 58% КОТР.

Биосферный резерват «Нижегородское Заволжье», функциональным центром которого является ГПБЗ «Керженский», получил сертификат ЮНЕСКО от 16.12.2002 г. В настоящее время заповедником с привлечением всех заинтересованных организаций составляются планы управления и развития биосферного резервата. Предполагается включение всей территории водно-болотного угодья «Камско-Бакалдинская группа болот (включая государственный природный заповедник «Керженский»)» в состав «зоны взаимодействия» биосферного резервата.

Составлен проект организации памятника природы «Озеро Светлое и примыкающий болотный массив» (площадь 4572,1 га, охранный зона 3402,5 га), включающий существующие памятники природы «Озеро Светлое» и «Болото Светлое». Документация утверждена органами местного самоуправления Воскресенского района.

Составляется положение о ВБУ международного значения «Камско-Бакалдинская группа болот», которое будет охраняться со статусом «территория охраняемого ландшафта».

30. Сурской отрог Чебоксарского водохранилища и примыкающий участок поймы р.р. Волга и Сура

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена возле устья р. Суры на востоке Воротынского района, примыкая к границе Нижегородской области с Республиками Марий Эл и Чувашской. Площадь КОТР - 114,31 км². Схема территории показана на рисунке 31.

Территория включает обширный участок акватории Чебоксарского водохранилища, а также обширный участок бывшей поймы, защищенный дамбой, на котором гидрологический режим поддерживается искусственно. Здесь чередуются участки лугов и пашни с фрагментами вторичных пойменных лесов, ивняковых зарослей и многочисленными водоемами.




Рис. 31. Схема КОТР «Сурской отрог Чебоксарского водохранилища и примыкающий участок поймы р.р. Волга и Сура»

Лесные земли занимают около 25% территории и относятся к государственному лесному фонду Михайловского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз, а также располагаются на территории, отведенной к 1980 г. под затопление Чебоксарского водохранилища. В лесах государственного лесного фонда ведутся лесохозяйственные мероприятия, намеченные лесоустройством, в остальных лесах лесохозяйственная деятельность практически не регламентирована. Сельхозугодья занимают около 56,5% площади, используются для выращивания зерновых и картофеля (20-25% площади), а также в качестве сенокосов и пастбищ (30-35%). Земли населенных пунктов занимают около 1,5% площади, акватория Чебоксарского водохранилища - 17%.

КОТР является местом концентрации на пролете большого количества водоплавающих и околоводных птиц. Весной через территорию пролетает около 30000 гусей, на полях останавливается одновременно не менее 2000 гусей. Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 24.

Орнитологическая характеристика КОТР «Сурской отрог Чебоксарского водохранилища и примыкающий участок поймы р.р. Волга и Сура»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Озерная чайка	гн.	400-500 пар	D3
Сизая чайка	гн.	2-3 пары	-
Серебристая чайка	гн.	5-6 пар	D2
Гуси	пр.	30000 особей (за весь период весеннего пролета) 2000 особей (останавливается одновременно)	A4

Угрозы деградации данной территории как КОТР нуждаются в дополнительном изучении. Возможен ущерб от весенней охоты и высокой рекреационной нагрузки. Вероятна деградация лугов и водоемов, как при современном искусственном гидрологическом режиме, так и в случае подъема уровня Чебоксарского водохранилища. Территориальной охраны нет.

31. Система болот и торфокарьеров у р.п. Фролищи и р.п. Чистое



Рис. 32. Схема КОТР «Система болот и торфокарьеров у р.п. Фролищи и р.п. Чистое»

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР занимает северо-западную часть Володарского района, небольшая часть на севере территории заходит в Чкаловский район. Площадь КОТР - 208,68 км². Схема территории показана на рисунке 32.

КОТР включает крупные сохранившиеся верховые и переходные болота и примыкающие обширные системы водоемов выработанных торфяных месторождений, а также окружающие их сосновые и мелколиственные леса

КОТР служит местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: рыжей вечерницы, двухцветного кожана, прудовой ночницы, обыкновенной гадюки, осок малочетковой и струнокорневой, клоквы мелкоплодной, кубышки малой, леерсии рисовидной, березы карликовой, росянки английской, морощки, кувшинки белой, острокильницы чернеющей, ликоподиеллы заливаемой, баранца обыкновенного.

Лесные земли занимают около 80% территории и относятся к государственному лесному фонду Гороховецкого военлесхоза и Городецкого лесхоза. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Леса Гороховецкого военлесхоза используются в качестве военных полигонов. Около 20% территории - земли, переданные торфопредприятию «Чистое». В конце 1990-х гг. на отдельных участках (не более 1% территории) еще велась разработка торфа фрезерным способом.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 25.

Кроме видов, указанных в таблице, на КОТР гнездятся занесенные в Красную книгу Нижегородской области птицы: чомга, сплюшка, трехпалый дятел, сизоворонка, луговой конек, а также зеленый дятел - вид, нуждающийся в особом контроле за численностью на территории Нижегородской области.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: изменения сложившегося гидрологического режима

Орнитологическая характеристика КОТР «Система болот и торфокарьеров у р.п. Фролищи и р.п. Чистое»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая цапля	гн.	2-3 пары	-
Серебристая чайка	гн.	198-203 пары	D2
Сизая чайка	гн.	2160-2660 пар	B2
Озерная чайка	гн.	150-240 пар	D3
Речная крачка	гн.	15-30 пар	-
Серый журавль	гн.	27 территориальных пар	D2
Змееяд	гн.	1 пара	D1
Филин	возм. гн.	1 пара	D1

Таблица 25

территории, рубки леса в водоохраных зонах болот и водоемов, весенняя охота, браконьерство.

Около 41,5% площади КОТР взято под охрану в качестве трех памятников природы («Болото Утрех и оз. Утрех», «Болото Варех и оз. Варех», «Озера Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив»), в случае создания спроектированного Володарского комплексного заказника под охраной окажется около 65% КОТР.

32. Торфокарьеры Володарского и Балахнинского районов (НГ-007)



Рис. 33. Схема КОТР «Торфокарьеры Володарского и Балахнинского районов»

кохозяйственных предприятий Балахнинского района, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Часть земель бывших торфоразработок (около 3% площади КОТР) переданы в госземфонд Балахнинского района. Земельный участок в центральной части КОТР занимает Чернораменская птицефабрика.

На карьерах сформировалось одно из крупнейших в области поселений чайковых птиц. С высокой плотностью гнездятся другие виды водоплавающих и околоводных птиц. Общая численность водоплавающих и околоводных птиц в гнездовой период составляет от 25000 (только взрослые особи) до 60000 (с учетом поднявшихся на крыло молодых).

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 26.

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена в междуречье Оки и Волги, в пределах Балахнинской низины, на территории Балахнинского и Володарского районов, а также землях г. Дзержинск. Площадь КОТР - 470,79 км². Схема территории показана на рисунке 33.

КОТР представляет собой несколько крупных систем водоемов выработанных торфяных месторождений, разделенных участками молодых и средневозрастных сосновых и березовых лесов. Экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений (торфокарьеры) сформировались после разработок торфа низинных, переходных и верховых болот в основном способом гидроразмыва. Кроме того, представлены неразработанные участки болот переходного и низинного типов. Основные типы местообитаний: молодые и средневозрастные березняки (20-60 лет) - 40%; молодые и средневозрастные сосняки (в том числе культуры сосны) - 25 %; водоемы выработанных торфяных месторождений - 20%; сплавины - 5%; низинные и переходные болота - 10%. Немного менее 1% площади занимают озера эолового происхождения, в том числе оз. Пырское (272 га) - самое крупное озеро области.

КОТР служит местом произрастания пальчатокоренника Траунштейнера и полушника колючеспорого (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, росянки английской, ладьяна трехнадрезного, ежеголовника Фриса, ив лагланской и черниковидной, ликопиделлы заливаемой, батрахоспермума четковидного.

Лесные земли занимают 97% территории и относятся к государственному лесному фонду Балахнинского и Дзержинского лесхозов, Гороховецкого военлесхоза, и к лесам сельс-

Таблица 26

Орнитологическая характеристика КОТР
«Торфокарьеры Володарского и Балахнинского районов»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	80-85 пар	D2
Красношейная поганка	гн.	70-80 пар	D2
Черношейная поганка	гн.	25-30 пар	D2
Большая выпь	гн.	70-100 пар	D2
Малая выпь	гн.	6-10 пар	D2
Кряква	гн.	130-150 выводков	D4
Красноголовый нырок	гн.	550-600 выводков	D4
Обыкновенный гоголь	гн.	15-20 выводков	D2
Хохлатая чернеть	гн.	500-550 выводков	D4
Широконоска	гн.	20-25 выводков	D2
Чирок-трескунок	гн.	50-70 выводков	D4
Чирок-свиистунок	гн.	15-20 выводков	-
Водоплавающие и околоводные птицы (всего)	гн.	25000-60000 особей	A4.3
Болотный лунь	гн.	10-15 пар	-
Камышница	гн.	20-30 пар	D4
Лысуха	гн.	60-80 пар	D2
Сизая чайка	гн.	5600-7800 пар	A4.1
Озерная чайка	гн.	3500-4000 пар	D3
Малая чайка	гн.	0-10 пар	-
Серебристая чайка	гн.	60-80 пар	D2
Речная крачка	гн.	380-440 пар	D2
Обыкновенный сверчок	гн.	?	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР: отвод земель под дачное строительство и садово-огородные участки, нарушение существующего гидрологического режима территории, весенняя охота, браконьерство, фактор беспокойства, выборочная рубка леса.

Сейчас около 7% территории КОТР взято под охрану в качестве двух памятников природы («Болото Пырское с озером Пырским», «Озеро Боровское»), после создания спроектированного и зарезервированного Балахнинского орнитологического заказника будет охраняться около 31 % площади. На территории заказника должны быть запрещены: отвод земель под садово-огородные участки, строительство; добыча полезных ископаемых; любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов; весенняя охота; посещение птичьих колоний в гнездовой период.

33. Водоем в р.п. Красная Горка

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в р.п. Красная Горка (железнодорожная станция Горбатовка) Володарского района и занимает 0,49 км². Схема территории показана на рисунке 34.



Рис. 34. Схема КОТР «Водоем в р.п. Красная Горка»

КОТР представляет собой водоем выработанного торфяного месторождения площадью 7 га, глубиной не более двух метров. Водоем имеет прямоугольную форму и разделен на 2 части перемычкой шириной около 50 м и протяженностью 280 м. Водоем окружен низинным березово-осоковым болотом. В 20-30 м от южного и восточного берегов водоема располагаются дома поселка Красная Горка. В 200 м к северу от водоема проходит железная дорога. К западу от водоема расположен массив выработанных машиноформовочным способом торфяных месторождений, в настоящее время сильно заросших и превратившихся в переходное сосново-березово-осоково-кустарничково-сфагновое болото. На водоеме прибрежно-водная растительность образует сплавины, расположенные вдоль берегов, в центральной части перемычки и в виде отдельных островов. Сплавины образованы, в основном, манником большим с участием осок, киззя, кистецветного и тростника. Реже встречаются сплавины, образованные рогозом широколистным и белокрыльником болотным.

КОТР находится на землях Красногорской поселковой администрации.

На КОТР расположена одна из крупнейших в Нижегородской области колоний озерной чайки (около 9 % от областной численности вида). В 1979-81 гг. численность озерной чайки составляла 3000 гнездовых пар; в 1992 г. - 3500 пар; в 1997 г. - 2500 - 3000 пар. КОТР выделена по критерию D3. В 1992 г. в колонии гнездились также 2-3 пары речных крачек. В 1992 и 1997 гг. в колонии присутствовали единичные негнездящиеся сизые чайки.

До 1997 г. угрозы деградации для данной КОТР не было, современное состояние нуждается в уточнении.

Спроектирован и зарезервирован памятник природы "Водоем с колонией озерных чаек в р.п. Красная Горка", после создания которого будет охраняться около 70% площади КОТР.

34. Пойма р. Оки от устья Клязьмы до г. Дзержинск

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР расположена вдоль границы Володарского района с Павловским и Богородским, небольшая часть территории - на землях г. Дзержинск. Площадь КОТР - 280,34 км². Схема территории показана на рисунке 35.




Рис. 35. Схема КОТР «Пойма р.Оки от устья Клязьмы до г. Дзержинск»

КОТР включает участок русла р. Оки с островами и песчаными пляжами, представлена первичная и вторичная пойменная растительность.

Территория служит местом обитания выхухоли (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: рыжей вечерницы, леерсии рисовидной, лунника оживающего, зубянки пятилистной, острокильницы чернеющей, многорядника Брауна.

Лесные земли занимают около 40% территории и относятся к государственному лесному фонду Дзержинского, Павловского и Богородского лесхозов, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Богородский и Павловский межхозяйственные лесхозы. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают около 50% площади, используются в основном в качестве сенокосов и пастбищ. Русло р. Волга и пойменные водоемы - около 10%.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 27.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, нарушения гидрологического режима территории, фактор беспокойства.

Около 18% территории охраняется в качестве двух памятников природы («Территория Желнино-Пушкино-Сейма», «Территория Красная Горка»), спроектировано еще 3 памятника природы («Пойма р. Клязьма в Ильинском лесничестве», «Лесной массив между д. Погорелка и д. Венец», «Территория коренного берега р. Оки д. Оленино - д. Дуденево - Дудин Монастырь»).

35. Система водоемов около р.п. Бабино

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена вокруг р.п. Бабино между окраинами г. Дзержинск и г. Н.Новгород. Площадь КОТР - 39,56 км². Схема территории показана на рисунке 36.



Рис. 36. Схема КОТР «Система водоемов около р.п. Бабино»

болот с доминированием в составе растительности ассоциаций рогоза широколистного, осок, манника большого. Низинные болота образовались как в результате зарастания пойменных водоемов, так и в результате подтопления участков территории при строительстве различных сооружений (дорог, дамб, отстойников и др.). Имеется система мелиоративных каналов.

КОТР служит местом обитания большой пяденицы болотной (голубичной), занесенной в Красную книгу Нижегородской области.

КОТР расположена на землях городов Дзержинск и Нижний Новгород. Лесные земли занимают около 20% территории и относятся к государственному лесному фонду Дзержинского и Нижегородского лесхозов. В лесах, за исключением ООПТ, ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Около 20% занимают водоемы и низинные болота. На остальной территории КОТР мозаично чередуются садово-огородные участки, пустыри с луговой и рудеральной растительностью, а также с техногенными сооружениями и коммуникациями, участки ивняковых зарослей.

Таблица 27

Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Оки от устья Клязьмы до г. Дзержинск»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая цапля	вер. гн.	10-20 пар	-
Большой подорлик	вер. гн.	1 пара	D1
Серый журавль	гн.	1-2 пары	-
Малая чайка	вер.гн.	80-160 пар	B2
Речная крачка	гн.	79-80 пар	D2
Малая крачка	гн.	89 пар	B2
Черная крачка	гн.	95-130 пар	D2
Белокрылая крачка	гн.	6-8 пар	-
Седой дятел	гн.	?	-

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 28, динамика численности чайковых - в таблице 29.

Таблица 28
Орнитологическая характеристика КОТР
«Система водоемов около р.п. Бабино»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	3 пары	-
Большая выпь	гн.	не менее 10 пар	D2
Широконоска	гн.	6-10 выводков	D2
Красноголовый нырок	гн.	20-40 выводков	D4
Хохлатая черныш	гн.	4-6 выводков	-
Крохаль sp.	лет.	1 самка	-
Озерная чайка	гн.	200-300 пар	D3
Малая чайка	гн.	0-10 пар	?
Речная крачка	гн.	15 пар	-
Белокрылая крачка	гн.	20-30 пар	D2
Черная крачка	гн.	20-30 пар	D2
Травник	гн.	20-25 пар	D2
Поручейник	гн.	6-8 пар	D2
Большой веретенник	гн.	не менее 10 пар	D2

Таблица 29
Динамика численности чайковых на КОТР «Система водоемов около р.п. Бабино»

Виды	Численность (гнездящихся пар) в годы:		
	1987	1992	1997
Озерная чайка	10000	7300	200-300
Малая чайка	900	10	0
Речная крачка	?	?	15
Белокрылая крачка	400	100	20-30
Черная крачка	50	50	20-30

Угрозы деградации данной территории как КОТР: изменение гидрологического режима территории, отвод и самовольный захват земель под садоводство и огородничество, строительство.

Охраняется около 8 % КОТР (памятник природы «Гнилицкие дачи»). Необходимо присвоение статуса территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением о Красной книге Нижегородской области».

36. Водоем с колонией чаек около пос. Строителей

Статус КОТР - областной.

КОТР находится у северо-восточной границы земель г. Дзержинск и занимает 0,74 км². Схема территории представлена на рисунке 37.

КОТР представляет собой водоем выработанного способом гидроразмыва торфяного месторождения площадью около 10 га. Он имеет неправильную форму и разделен на 2 части перемычкой шириной 10-30 м. Водоем окружен остепненными сосновыми борами в возрасте 50-60 лет на песчаных дюнах. На водоеме прибрежно-водная растительность образует широкий пояс вдоль берегов. Здесь представлены сообщества с доминированием осоки вздутой или хвоща приречного. Значительные участки занимает ассоциация кубышки желтой. Сплавины, образованные либо рогозом широколистным, либо сфагновыми мхами и осокой вздутой, занимают около 10 % площади водоема.

КОТР расположена на землях Дзержинского лесхоза.

На водоеме расположена крупная колония озерных чаек, где гнездится около 1% областной численности вида (критерий D3). Численность озерных чаек: в 1994 г. - около 500 пар, в 1997 г. - 270 пар. В 1994 г. обнаружены 2 пары речных крачек и 3 гнезда краквы.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: рубки главного пользования в водоохранной зоне.

Спроектирован памятник природы "Водоем с колонией чаек около пос. Строителей", границы охранной зоны которого совпадают с границами КОТР.




Рис. 37. Схема КОТР «Водоем с колонией чаек около пос. Строителей»

37. Массив верховых и переходных болот в Павловском Заочье и примыкающий участок поймы р. Оки




Рис. 38. Схема КОТР «Массив верховых и переходных болот в Павловском Заочье и примыкающий участок поймы р. Оки»

ния вухохли и аполлона и произрастания пальчатокоренника Траунштейнера и чилима (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: ранатры, сальвии плавающей, росянки английской, клоквы мелкоплодной, осоки малоцветковой, баранца обыкновенного.

Лесные земли занимают около 85% территории и относятся к государственному лесному фонду Павловского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Вачский и Павловский межхозяйственные лесхозы. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (сенокосы и пастбища с небольшими участками пашни и залежей) занимают около 8% площади; русло р. Ока и пойменные водоемы — около 5%, земли населенных пунктов - 1,8%.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 30.

Орнитологическая характеристика КОТР «Массив верховых и переходных болот в Павловском Заочье и примыкающий участок поймы р. Оки»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	3-4 пары	-
Черношейная поганка	гн.	1-2 пары	-
Серая цапля	гн.	8-13 пар	-
Змееяд	вер.гн.	1 пара	D1
Серый журавль	гн.	30-35 территориальных пар	D2
Лысуха	гн.	15-20 пар	D2
Малый погоныш	гн.	1-3 пары	D2
Фиф и	гн.	?	-
Сизая чайка	гн.	ПО пар	-
Озерная чайка	гн.	530 пар	D3
Серебристая чайка	гн.	1 пара	-
Малая чайка	гн.	130-235 пар	B2
Малая крачка	гн.	118-119 пар	B2
Речная крачка	гн.	181 пара	D2
Черная крачка	гн.	172-202 пары	B2
Белокрылая крачка	гн.	105-225 пар	D2
Зеленый дятел	гн.	?	-
Трехпалый дятел	гн.	?	-
Серый сорокопут	гн.	1-3 пары	D1

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР занимает практически все левобережье р. Оки в Павловском районе, незначительная часть площади расположена в правобережье, на территории Павловского и Вачского районов. Площадь КОТР - 455,76 км². Схема территории представлена на рисунке 38.

КОТР включает крупные верховые и переходные болота, системы водоемов выработанных торфяных месторождений, перемежающиеся с разновозрастными сосновыми лесами, а также участок русла р. Оки и ее пойму с лугами, дубравами и старицами.

Территория служит местом обита-

Таблица 30

Угрозы деградации данной территории как КОТР: лесные пожары, сплошные и выборочные рубки леса, фактор беспокойства; потенциальная угроза - мелиорация и разработка торфа.

23,4% территории охраняется в границах комплексного заказника и двух памятников природы ("Озеро Святое Тумботинское", "Озеро Лошиное")- После утверждения спроектированных и зарезервированных двух памятников природы ("Грузлевские торфокарьеры", "Залив р. Оки у п. Варез") и территории охраняемого ландшафта "Павловское Заочье" основная часть КОТР окажется под охраной.

38. Озеро Ворсменское

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в Павловском районе, примыкает с востока к г. Ворсма. Площадь КОТР - 7,79 км². Схема территории показана на рисунке 39.




Рис. 39. Схема КОТР «Озеро Ворсменское»

КОТР представляет собой искусственный водоем площадью 126 га, образовавшийся в результате запруживания р. Кишма и затопления крупной карстовой котловины с системой карстовых озер. Озеро имеет неправильную форму, его берега осложнены множеством заливов и бухт. Дно неровное, с многочисленными провалами. В провальных ямах расположены вкюльзы - подводные источники, места разгрузки подземных карстовых вод. Озеро проточное, его уровень регулируется пусками воды через плотину. На озере имеется несколько островов, на самом крупном из них - развалины монастыря. Вдоль уреза воды тянется растительный пояс шириной от 1 до 8 м с преобладанием осок. Заросли тростника обыкновенного, рогозов широколистного и узколистного и камыша озерного как образуют пояс шириной до 20 м вдоль берегов, так и располагаются большими пятнами на мелководьях в центральной части

озера. Распространены также заросли погруженных водных растений - рдестов, элодеи, роголистников, харовых водорослей и др.

Территория служит местом произрастания лютика Кауфмана, занесенного в Красную книгу Нижегородской области.

КОТР расположена на землях города Ворсма, используется в основном как место отдыха населения.

Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в таблице 31, динамика числен-

Таблица 31

Численность нуждающихся в охране птиц на КОТР «Озеро Ворсменское»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Лебедь-шипун	вер. гн.	1 пара	D2
Лысуха	гн.	3-10 пар	D2
Поручейник	гн.	3-5 пар	D2
Турухтан	пр. (ток)	около 50 особей	-
Речная крачка	гн.	2-3 пары	-
Черная крачка	гн.	30-100 пар	D2

Таблица 32

Динамика численности чайковых на оз. Ворсменское

Вид чайковых	Численность птиц (гнездовых пар) в годы:			
	1991	1993	1997	2000
Озерная чайка	300*	360	0 (кормятся 10 особей)	0
Малая чайка	20**	10	0	0
Речная крачка	+	3	0 (кормятся 10 особей)	2
Черная крачка	+	30-40	0 (кормятся 10 особей)	80-100
Белокрылая крачка	-	5	0	0

* Большинство гнезд с яйцами и пуховыми птенцам сгорело, сохранилось только 7 гнезд.

** Все гнезда сгорели.

+ - отмечено присутствие вида на озере, численность не определена.

коньерство; фактор беспокойства.

Около 49% территории КОТР охраняется в качестве памятника природы «Озеро Ворсменское (Тосканка)».

ности Майковых - в таблице 32.

Кроме указанных в таблицах видов на КОТР в разные годы были отмечены на гнездовании: чомга, большая выпь, краквя, чирок-трескунок, красно-головый нырок, широконоска, болотный лунь, мородунка, чибис, травник, малый зуек, камышница, дроздовидная камышевка; на пролете: фифи, большой улит, краснозобый конек.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: производимый в отдельные годы сброс воды и значительное снижение уровня водоема во время весеннего паводка, обычно сопровождающийся выжиганием зарослей прибрежных растений; весенняя охота; бра-

39. Пруд в с. Шелокша

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в Кстовском районе, примыкает к с. Шелокша с запада, к д. Каменка с юга. Площадь КОТР - 1,82 км². Схема территории показана на рисунке 40.




Рис. 40. Схема КОТР «Пруд с. Шелокша»

ним следует пояс шириной 10-20 м с доминированием тростника обыкновенного. Центральную часть занимают разреженные заросли тростника обыкновенного с куртинами рогоза широколистного и осок острой и омовой.

КОТР расположена на землях совхоза «Тепличный», используется как место отдыха населения. Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 33.

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.

Территориальной охраны нет.

КОТР представляет собой пруд с постоянным гидрологическим режимом площадью 22 га. Длина пруда - 1800 м, ширина в припрудной части - до 370 м, в основном - 120-180 м. По берегам основной части пруда тянется сплошной пояс прибрежной растительности шириной от 1-3 до 10-15 м с доминированием осоки острой. Местами встречаются отдельные куртины рогоза широколистного и хвоща приречного. Верхняя (западная) часть пруда длиной около 400 м и шириной до 100 м мелководная: преобладающая глубина - 0,5-0,8 м. Этот участок почти полностью занят прибрежно-водной растительностью. По берегу - пояс шириной 10-25 м с доминированием осоки острой, за

Таблица 33

Орнитологическая характеристика КОТР
«Пруд с. Шелокша»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	2 пары	-
Кряква	гн.	1-2 выводка	-
Чирок-трескунок	гн.	2-3 выводка	-
Красноголовый нырок	гн.	5-7 выводков	-
Хохлатая чернеть	гн.	4-5 выводков	-
Лысум	гн.	1 пара	-
Черная крачка	гн.	30 пар	D2
Белокрылая крачка	гн.	5 пар	-
Речная крачка	гн.	1 пара	-
Травник	гн.	3-4 пары	-

40. Долина реки Шава, включая пруды рыбхоза «Борок»




Рис. 41. Схема КОТР «Долина реки Шава, включая пруды рыбхоза «Борок»

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в Кстовском районе около с. Запрудное. Площадь КОТР - 14,0 км². Схема территории показана на рисунке 41.

КОТР включает крупный рыбопродуктивный пруд, примыкающее низинное тростниковое болото и остепненные луга в их водоохранной зоне. Территория служит местом произрастания дремлика болотного, занесенного в Красную книгу Нижегородской области.

КОТР расположена на землях рыбхоза «Борок» и совхоза «Запрудновский». Пруды используются для рыбопродукции, остепненные луга служат пастбищами, на небольших участках болота в прошлом добывали торф.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 34.

Кроме перечисленных в таблице видов, на КОТР гнездятся обыкновенный сверчок, чечевица, желтоголовая трясогузка, камышовая овсянка, садовая камышевка, дроздовидная камышевка, серая славка. КОТР служит местом остановки водоплавающих и околоводных птиц на пролете: одновременно скапливаются гуси - около 200 особей, утки - около 500 особей.

Орнитологическая характеристика КОТР «Долина реки Шава, включая пруды рыбхоза «Борок»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	50-60 пар	D2
Черношейная поганка	гн.	4 пары	D2
Большая выпь	гн.	5 пар	-
Серая утка	гн.	3-4 выводка	D2
Кряква	гн.	12-15 выводков	-
Широконоска	гн.	8-10 выводков	D2
Связь	гн.	4-6 выводков	D2
Чирок-трескунок	гн.	20-25 выводков	-
Красноголовый нырок	гн.	40-50 выводков	D4
Хохлатая чернеть	гн.	15-20 выводков	-
Лысуэя	гн.	10-12 пар	D2
Перевозчик	гн.	2-3 пары	-
Турухтан	пр.	30 особей	-
Черноголовый хохотун	лет.	1 особь	-
Канюк	гн.	1 пара	-
Черный коршун	гн.	2-3 пары	-
Болотный лунь	гн.	5 пар	-
Пустельга	гн.	1 пара	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.

Около 27% площади КОТР охраняется в качестве памятника природы «Болото Шава».

4.1. Пойма р. Оки в Вачском районе и примыкающие территории Владимирской области

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР охватывает участок склона правого берега, русла и поймы р. Оки в пределах Вачского района, заходя небольшим участком на север Навашинского района Нижегородской области, а также включает примыкающие участки левобережной поймы и надпойменной террасы р. Оки в Гороховецком и Муромском районах Владимирской области. Площадь КОТР - 270,15 км². Схема территории показана на рисунке 42.

На КОТР представлены русло р. Оки с островами и песчаными пляжами; старовозрастные широколиственные леса из липы, ясеня, вяза и дуба, местами с участием сосны на коренном склоне правого берега р. Оки; обширный массив пойменных лугов с многочисленными старицами, участками пойменных дубрав, производных осинников и низинных черноольховых болот; массив разновозрастных сосновых и мелколиственных лесов на левобережной надпойменной террасе р. Оки.

Территория служит местом обитания выхухоли, произрастания венерина башмачка настоящего и чилима (Красная книга РФ).

Лесные земли занимают около 60% территории. В Нижегородской области леса относятся к государственному лесному фонду бачского и Навашинского лесхозов, а также к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Вачский межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (в основном сенокосы и пастбища, а также участки пашни




Рис. 42. Схема КОТР «Пойма р.Оки в Вачском районе и примыкающие территории Владимирской области»

и залежей) занимают около 33% площади; русло р. Ока и пойменные водоемы - 6%, земли населенных пунктов - 1,3%.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 35.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, весенняя охота, фактор беспокойства; потенциальную угрозу представляет осушительная мелиорация.

Около 0,9% площади КОТР охраняется в качестве двух памятников природы («Участок леса по склону коренного берега р. Оки между д. Сапун и пристанью Пожого», «Участок леса по склону коренного берега р. Оки у д. Короваво»). На территории создан Муромский охотничий заказник федерального значения (Владимирская область).

Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Оки в Вачском районе и примыкающие территории Владимирской области»

Таблица 35

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Гуси	пр.	10000 особей (за весь период весеннего пролета)	B1.1
Большой подорлик	гн.	2 пары	A1
Коростель	гн.	250-400 токующих самцов	A1
Речная крачка	гн.	45 пар	-
Малая крачка	гн.	50 пар	B2
Черная крачка	гн.	10-15 пар	-
Белокрылая крачка	гн.	2-3 пары	-
Сплюшка	гн.	1-2 пары	D2



Рис. 43. Схема КОТР «Пруды Борцовского рыбхоза»

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.

В качестве памятника природы "Участок леса с колонией серых цапель близ с. Сарлей" охраняется 3,2% территории.

42. Пруды Борцовского рыбхоза

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в центральной части Дальнеконстантиновского района около с. Богоявление и занимает 8,57 км². Схема территории показана на рисунке 43.

КОТР представляет собой систему рыбопродуктивных прудов с примыкающими участками заболоченной поймы малой речки Печеть, сельскохозяйственными угодьями и островками культур соевых и мелколиственных лесов по берегам.

Лесные земли занимают около 14% территории и, наряду с сельскохозяйственными, принадлежат Государственной сортоиспытательной станции «Дальнеконстантиновская». На прудах существует рыбопродуктивное хозяйство.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 36.

Таблица 36

Орнитологическая характеристика КОТР «Пруды Борцовского рыбхоза»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая цапля	гн.	39 пар	D2
Озерная чайка	гн.	50 пар	-
Речная крачка	гн.	5-6 пар	-

43. Сосново-можевеловый остепненный массив

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в северо-восточной части Дальнеконстантиновского района около д. Ямные Березники и занимает 6,36 км². Схема территории показана на рисунке 44.

КОТР представляет собой два участка высоковозрастных сосновых боров и примыкающий участок остепненных лугов и луговых степей.

Территория служит местом произрастания венерина башмачка настоящего (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: переливницы большой, кизильника черноплодного, вишни степной, ковыля перистого, льна желтого, колокольчика сибирского, скабиозы желтой, чистеца прямого.

Лесные земли занимают около 50% территории и относятся к государственному лесному фонду Дальнеконстантиновского лесхоза. Сельхозугодья занимают около 50% площади, используются в основном в качестве пастбищ.


Территория служит местом гнездования 1 пары филина (критерий D1).

Существует потенциальная угроза самовольных рубок леса и перевыпаса скота.

В качестве памятника природы "Сосново-можжевельовый остепненный массив" охраняется 54,5% площади КОТР, включая все важные для птиц местообитания.

Рис. 44. Схема КОТР

«Сосново-можжевельовый остепненный массив»



44. Долина верховьев р. Озерки

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в восточной части Дальнеконстантиновского района около с. Берсеменово и занимает 11,16 км². Схема территории показана на рисунке 45.

КОТР включает участок заболоченной поймы и массив остепненных лугов и луговых степей по коренным склонам долины р. Озерки.




Рис. 45. Схема КОТР

«Долина верховьев р. Озерки»

Пойму р. Озерки занимает низинное осоковое болото с отдельными низкорослыми березами и куртинами ивняков. Представленные на КОТР участки луговых степей и остепненных лугов входят в состав самого северного в Нижегородской области Мурашкинско-Княгининского района распространения степной растительности. Склоны долины р. Озерки имеют высоту от 15-20 до 50 м, крутизну - от 15-20 до 45-50 градусов; южную, юго-западную и западную экспозицию. На них отмечено более 100 видов растений, среди которых ковыли перистый и красивейший (Красная книга РФ), виды, занесенные в Красную книгу Нижегородской области: ковыль-волосатик, адонис весенний, овсец пустынный, осока Эдера, подмаренник красильный, колокольчик сибирский, василек русский, наголоватка паутинистая, мытник Кауфмана, скабиоза желтая, козелец пурпуровый, вишня степная, лен желтый, чистец прямой.

Остепненные склоны долины р. Озерки используются в основном в качестве пастбищ.

На КОТР гнездится 4-6 пар больших кроншнепов (критерий D1), возможно гнездование одной пары степного луна (критерий D1).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: ме-

лиорация поймы, перевыпас скота на степных склонах, весенняя охота.

В границах памятника природы "Склоны долины верховьев р. Озерки" охраняется 6,3% КОТР.

45. Долина р. Урга у с. Низовка

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на р.Урге в западной части Спасского и юго-восточной части Лысковского районов и занимает 43,76 км². Схема территории показана на рисунке 46.

На КОТР представлены пойменные луга и низинные болота (в пойме р.Урги), остепненные луга с участками пашни, залежей и небольшими фрагментами лесов на надпойменных террасах.

Лесные земли занимают около 5% территории и относятся к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В них ведутся недостаточно регламентированные рубки. Сельхозугодья занимают основную часть территории (87%). Они используются в основном в качестве сенокосов и пастбищ, к которым примыкают небольшие участки пашни и залежей. Заболоченные неудобья в пойме р.Урги занимают около 5% площади, земли населенных пунктов - 2%, водоемы - около 1%.




Рис. 46. Схема КОТР

«Долина р.Урга у с.Низовка»

На КОТР гнездится одна пара белых аистов (критерий D1); вероятно, территория является местом концентрации во время пролета водоплавающих и околоводных птиц, что нуждается в дополнительном изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: мелиорация поймы, возможно - браконьерство.

Территориальной охраны нет.

46. Территория предотлетного скопления журавлей у с. Русское Маклаково

Статус КОТР - международный (европейский).




Рис. 47. Схема КОТР «Территория предотлетного скопления серых журавлей у с. Русское Маклаково»

КОТР расположена в основном в юго-западной части Спасского района, заходя небольшим участком в Княгининский район и занимает 111,38 км². Схема территории показана на рисунке 47.

Территорию занимают в основном крупные массивы полей зерновых с небольшими участками островных лесов, разрезанные узкими долинами малых рек с остепненными лугами по склонам.

Лесные земли занимают около 10% территории и относятся к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В них ведутся недостаточно регламентированные рубки. Основную часть территории занимают пахотные угодья (поля зерновых). Склоны балок (долин малых рек) используются в качестве пастбищ. Заболоченные поймы малых рек занимают около 1% площади, земли населенных пунктов - около 2%.

КОТР служит местом предотлетного скопления серых журавлей, насчитывающего от 400 до 1000 особей (критерий В 1,1).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: неизвестны.

Территориальной охраны нет.

47. Поймы рек Урга и Урынга между с.с. Покров Майдан и Антоново

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена у восточной границы Спасского района (на границе с Пильнинским и Воротынским районами) и занимает 24,50 км². Схема территории показана на рисунке 48.

На КОТР представлены пойменные луга и низинные болота (частично пройденные мелиорацией) с небольшими фрагментами пойменных лесов. Лесные земли занимают около 5% территории и относятся к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В них ведутся недостаточно регламентированные рубки. Сельхозугодья (в основном сенокосы и пастбища) занимают основную часть территории.

КОТР является местом концентрации во время пролета водоплавающих и околоводных птиц: уток - до 2000 особей (критерий D4), большого количества куликов разных видов. Вероятно гнездится белая лазоревка (критерий D1).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, мелиорация поймы.

Спроектирован памятник природы "Пойма р. Урги между с. Покров Майдан (Воротынского района) и с. Антоново (Спасского района)".




Рис. 48. Схема КОТР «Пойма рек Урга и Урынга между с.с. Покров Майдан и Антоново»

48. Курмышская пойма

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена в северной части Пильнинского района и занимает 244,89 км². Схема территории показана на рисунке 49.

КОТР представляет собой массивы пойменных лесов и лугов с примыкающими участками полей зерновых. Пойменные леса занимают 10% территории, молодые осинники и липняки порослевого происхождения в планировавшейся зоне затопления - 14%, островные широколиственные и мелколиственные леса на надпойменных террасах - 3%, пойменные луга - 15%, водораздельные луга - 10%, песчаные пляжи и острова - 1%, стоячие пресные водоемы - 2%, реки и ручьи - 3%, низинные болота - 3%, пашня - 36%, парки, сады - 1%, сельские населенные пункты - 2%.

Здесь отмечены занесенные в Красную книгу Нижегородской области виды насекомых (полксена, махаон, рататра) и растений (рдест Фриса).

Лесные земли занимают 27% территории и относятся к государственному

лесному фонду Сергачского лесхоза, где ведется комплекс лесохозяйственных мероприятий наметенных лесоустройством, а также к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз, и к лесам в зоне планировавшегося затопления, где лесохозяйственная деятельность практически не регламентирована. Сельхозугодья занимают 61% площади и используются как пастбища - 15%, сенокосы - 10%, для выращивания зерновых, кукурузы, картофеля, сахарной свеклы - 36%.

КОТР служит местом предотлетного скопления до 1100 серых журавлей, местом концентрации на пролете большого количества водоплавающих и околоводных птиц. Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 37.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: осушительная мелиорация, сплошные и выборочные рубки леса, интенсивное применение удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве, весенняя охота, браконьерство, фактор беспокойства. КОТР будет уничтожена в случае подъема уровня Чебоксарского водохранилища выше существующей в настоящее время отметки 63 м.

Существующий памятник природы "Пойменный лес с колонией серых цапель у с. Курмыш" занимает около 0,1 % площади КОТР, спроектированный памятник природы "Пойма р. Сура у села Курмыш" - 3,4%. Необходима организация территории охраняемого ландшафта регионального (областного) значения («Пойма р. Суры от устья р. Урги до с. Бортсурманы и прилегающая территория»).




Рис. 49. Схема КОТР «Курмышская пойма»

Орнитологическая характеристика КОТР «Курмышская пойма»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая цапля	гн.	413 пар	D2
Большой подорлик	гн.	1-2 пары	A1
Канюк	гн.	10 пар	-
Черный коршун	гн.	25 пар	-
Луговой лунь	гн.	36 пар	-
Полевой лунь	гн.	5 пар	-
Болотный лунь	гн.	2S пар	-
Пустельга	гн.	15 пар	D2
Кобчик	гн.	5 пар	D2
Кобчик	пр.	4-5 особей	-
Болотная сова	гн.	2S пар	D2
Ушастая сова	гн.	5 пар	-
Серый журавль	гн.	23 территориальные пары	B1.1
	лет.	171 особь	
	предотлетное скопление	500-1100 особей	
Коростель	гн.	100-200 токующих самцов	A1
Малая крачка	гн.	50 пар	B2
Речная крачка	гн.	70 пар	D2
Черная крачка	гн.	35-55 пар	D2
Клинтух	гн.	1-2 пары	-
Домовый сыч	гн.	1 пара	D2

49. Пойма р. Оки в Навашином районе



Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР расположена в западной части Навашиномского района, примыкая к границе Нижегородской и Владимирской областей около г. Мурома. Площадь КОТР - 191,0 км². Схема территории показана на рисунке 50.

КОТР представляет собой обширный массив пойменных лугов с многочисленными водоемами, массивами ивняковых зарослей и небольшими участками лесов; включает русло р. Оки с островами и песчаными пляжами.

Территория служит местом обитания выхухоли, занесенной в Красные книги МСОП, РФ и Нижегородской области.

Лесные земли (включая ивняки) занимают около 25% территории и относятся к государственному лесному фонду Навашиномского лесхоза и к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья, используемые в основном в качестве сенокосов и пастбищ, занимают около 65 % площади; русло р. Оки и пойменные водоемы - около 10 %; земли населенных пунктов - менее 1%.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 38.

Рис. 50. Схема КОТР «Пойма р.Оки»

Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Оки в Навашином районе»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Гуси	пр.	10000 особей (за весь период весеннего пролета)	B1.1
Кулик-сорока	гн.	8-12 пар	D1 (C1?)
Сизая чайка	гн.	10 пар	-
Речная крачка	гн.	72-73 пары	D2
Малая крачка	гн.	84-85 пар	B2
Черная крачка	гн.	20-25 пар	D2

Орнитологическая значимость территории, в том числе как остановки водоплавающих и околоводных птиц на пролете, нуждается в дополнительном изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство, фактор беспокойства.

Территория полностью находится в границах Навашинского государственного биологического (охотничьего) заказника, режим которого недостаточен для сохранения КОТР.

50. Торфокарьеры около разъезда Мезино

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в Навашином районе, в 4 км к востоку от районного центра г. Навашино, в кв. 50,51,69, 70 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза к югу от железной дороги г.Навашино - г. Арзамас. Площадь КОТР - 7,52 км². Схема территории показана на рисунке 51.

КОТР представляет собой четыре системы водоемов выработанного торфяного месторождения, окруженные разновозрастными сосновыми и мелколиственными лесами. Торфяное месторождение разрабатывалось до 1930-х годов, сначала машиноформовочным способом, затем - гидроразрывом. Большинство карьеров мелководные, сильно заросшие прибрежно-водными и болотными растениями. Торфокарьеры и восстанавливающиеся болота занимают около 10 % площади КОТР. На территории расположено оз. Великое (1,3 % площади). Остальную часть территории занимают леса.

КОТР является местом произрастания ивы черниковидной, занесенной в Красную книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Навашинского лесхоза. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 39.




Рис. 51. Схема КОТР
«Торфокарьеры около разъезда Мезино»

Таблица 3S

Орнитологическая характеристика КОТР «Торфокарьеры около разъезда Мезино»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Кряква	гн.	2-3 выводка	-
Широконоска	гн.	2-3 выводка	-
Чирок-трескунок	гн.	6-8 выводков	-
Чирок-свиистунок	гн.	2-4 выводка	-
Хохлатая чернеть	гн.	2-4 выводка	-
Дербник	гн.	1 пара	D2
Черныш	гн.	2 особи	-
Дупель	гн.	?	-
Сизая чайка	гн.	60 пар	-
Озерная чайка	гн.	60 пар	-
Речная крачка	гн.	14 пар	-
Седой дятел	гн.	1 пара	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса; возможно - весенняя охота.

В южной части КОТР спроектирован и зарезервирован памятник природы «Озеро великое с окружающим болотом» площадью 2,2 км², включая охранную зону. Северной части КОТР необходимо присвоить статус территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением о Красной книге Нижегородской области».

51. Массив лесов и болот около устья р. Сережи

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на границе Вачского и Навашинского районов и занимает площадь 248,22 км². Схема территории показана на рисунке 52.



Рис. 52. Схема КОТР
«Массив лесов и болот около устья р. Серези»

Имеющиеся сведения о численности охраняемых птиц на данной территории приведены в таблице 40.

Кроме видов, перечисленных в таблице, на КОТР гнездятся серый сорокопут (Красная книга РФ), а также занесенные в Красную книгу Нижегородской области глухая кукушка, сизоворонка, зимородок, трехпалый дятел.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, разработки торфа и осушительная мелиорация.

После организации спроектированной территории охраняемого ландшафта «Илимдиг» и проектируемых памятников природы «Участок соснового леса у д. Кистаново», «Участки дубрав по р. Сереже в Сонинском лесничестве», «Заболоченный лесной массив в Сонинском лесничестве» под охраной окажется более 90% площади КОТР.

На территории представлены разновозрастные сосновые леса, перемежающиеся с многочисленными верховыми, переходными и низинными болотами.

КОТР служит местом произрастания пальчатокоренника Траунштейнера, занесенного в Красные книги РФ и Нижегородской области, местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, махаона, росянки английской, ивы черниковидной, осоки желтой, рдеста альпийского.

Лесные земли занимают 98 % территории и относятся к государственному лесному фонду Вачского и Навашинского лесхозов. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Около 2 % территории занимают сенокосные угодья сельхозпредприятий.

Таблица 40

Численность охраняемых видов птиц на КОТР «Массив лесов и болот около устья р. Сережи»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Змея	вер. гн.	1 пара	D1
Большой подорлик	гн.	1 пара	D1
Кобчик	гн.	1 пара	D2
Серый журавль	гн.	30-40 территориальных пар	D2

52. Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении р. Серези (НГ-003)

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена в среднем течении р. Сережи в Сосновском и Арзамасском районах и занимает 283,7 км². Схема территории показана на рисунке 53.

Территория отличается большим разнообразием типов местообитаний. Здесь представлены хвойно-широколиственные леса (в том числе наиболее крупный в Нижегородской области массив, почти не затронутый рубками), сосновые боры разного возраста, пойменные дубравы, переходные, верховые и низинные болота, пойменные и материковые луга, карстовые озера, пойменные водоемы, залежи на месте заброшенных полей. На многих участках ярко выражены карстовые явления. Основные типы местообитаний занимают: леса - 64 %. в том числе высоковозрастные

хвойно-широколиственные-5%, сосновые боры-44% (в том числе высоковозрастные- 10%), пойменные дубравы-1 %, производные березняки, осинники, липняки -14 %; верховые, переходные и низинные болота - 20 %, луга - 6 %, озера - 3 %, залежи - 7 %.

КОТР служит местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу РФ: выхухоли, гигантской вечерницы, аполлона, мнемозины, венера башмачка настоящего, пыльцеголовника красного, чилима; местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: орешниковой сони, ночниц водяной, прудовой и Брандта, вечерниц рыжей и малой, лесного нетопыря, двухцветного кожана, обыкновенной гадюки, махаона, подалирия, переливницы большой, жулики блестящей, копра лунного, плавуна широкого, кобылок бескрылой и голубокрылой, пчелы-плотника, шмеля мохового, лесного муравья волосистого, муравья-амазонки, древоточца блестящего, паука-серебрянки, бурсарии, спиростомума, стокезии, тинтиннидиума, ладьяна трехнадрезного, башмачка крапчатого, гаммарбии болотной, наяды морской, каулинии (наяды) малой, росянки английской, осоки малоцветковой, ив лапландской и черниковидной, водяники черной, дремлика болотного, клюквы мелкоплодной, осок богемской и малоцветковой, рдестов волосовидного, длиннейшего и Фриса, чабреца обыкновенного, цмина песчаного, манника литовского, роголистника крылатого, пузырника судетского, голокучника Роберта, диплазия сибирского, гроздовников виргинского и полулунного, ужовника обыкновенного, хвоща камышового, баранца обыкновенного, батрахоспермума четковидного.

Лесные земли занимают 84% территории и относятся к государственному лесному фонду Арзамасского и Сосновского лесхозов. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки леса, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (луга и залежи) занимают около 13% площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ. Земли населенных пунктов занимают менее 1% площади. Доли территории с разными видами хозяйственного использования следующие: выпас скота - 25%, лесное хозяйство - 60%, сплошные рубки леса - 25%, выборочные рубки леса - 50%, охотничье хозяйство - 60%, любительское рыболовство - 3%, рекреация - 50%, сенокосение - 5%.

Для КОТР характерно высокое разнообразие видов птиц: гнездятся 146 видов, 6 видов вероятно гнездятся, 17 видов - летующие, пролетные или залетные. Здесь зарегистрировано большое число видов птиц, нуждающихся в охране на различных уровнях (от всемирного до регионального). Для данной территории установлено большое разнообразие и высокая численность дневных хищных птиц (таблица 39). Здесь существует наиболее крупная в Нижегородской области и, вероятно, на Окско-Донской равнине гнездовая орла-карлика. Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в таблице 41.

Таблица 41

Численность нуждающихся в охране птиц на КОТР
«Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении р. Сereжe»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	3-5 пар	-
Малая выпь	гн.	5-7 пар	D2
Скопа	пр., лет.	1-2 особи	-
Большой подорлик	гн.	1-2 пары	A1
Беркут	пр., зим.	0-1 особь	-
Орел-карлик	гн.	3-5 пар	B2
Змееяд	возм.гн.	1 пара	D1
Зимняк	пр., зим.	?	-
Канюк	гн.	15 пар	-
Черный коршун	гн.	12-15 пар	-
Обыкновенный осоед	гн.	6-12 пар	-
Тетеревятник	гн.	3 пары	-
Перепелятник	гн.	3 пары	-
Полевой лунь	гн.	8-12 пар	-
Луговой лунь	гн.	4-6 пар	-
Болотный лунь	гн.	2-3 пары	-
Обыкновенная пустельга	гн.	6 пар	-
Чеглок	гн.	12 пар	-
Сапсан	гн.	0-1 пара	D1
Серый журавль	гн.	8-12 территориальных пар	D2
Коростель	гн.	30-40 пар	A1
Малый погоныш	гн.	1 пара	D2
Сизая чайка	гн.	5-10 пар	-
Речная крачка	гн.	2-3 пары	
Белокрылая крачка	гн.	15-50 пар	D2
Черная крачка	гн.	5-10 пар	
Филин	гн.	2-3 пары	D1

Кроме перечисленных в таблице на КОТР гнездятся охраняемые и нуждающиеся в охране виды птиц: серый сорокопут (Красная книга РФ), занесенные в Красную книгу Нижегородской области поручейник, фифи, мородунка, клинтух, зимородок, сизоворонка, седой дятел, трехпалый дятел, ястребиная славка, мухоловка-белошейка, обыкновенный сверчок; нуждающиеся в особом контроле на территории Нижегородской области перепел, большой веретенник, травник, серая неясыть, болотная сова, воробьиный и мохноногий сычи, юла, крапивник, садовая овсянка. В 1978-80 г.г. были отмечены поющие самцы канареечного вьюрка.



Рис. 53. Схема КОТР

«Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении р. Серези»

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошная рубка леса, выборочная рубка леса, выпас скота в лесу, дачное строительство, весенняя охота, браконьерство, рекреационная нагрузка, фактор беспокойства.

В настоящее время охраняется около 22% площади КОТР в границах охотничьего заказника (Пустынский государственный биологический (охотничий) заказник) и 15% от площади КОТР в границах 8 памятников природы («Озеро Токмарево и окружающий лесной массив», «Болото Горское», «Озеро Горское», «Болото Развино», «Озеро Большое Унзово», «Пустыньские озера», «Болото Мостовое», «Болото Козье»). После организации спроектированного и зарезервированного Пустынского комплексного заказника достаточная часть территории (около 70%) будет обеспечена охраной.

53. Массив лесов и болот в Степурином и Тешинском лесничествах

Статус КОТР - областной.

КОТР включает участок поймы р. Теша, надпойменные террасы и водораздельный склон вдоль границы Навашиного и Кулебакского районов. Площадь КОТР - 129,83 км². Схема территории показана на рисунке 54.




Рис. 54. Схема КОТР

«Массив лесов и болот в Степурином и Тешинском лесничествах»

На КОТР представлены разновозрастные сосновые леса, перемежающиеся с многочисленными верховыми, переходными и низинными болотами, участки старовозрастных пойменных дубрав, заливных лугов, участок русла средних размеров, карстовые озера и пойменные водоемы.

Территория служит местом произрастания полушников озерного и колючеспорого, местом обитания жука-отшельника (Красная книга РФ), местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, шмелей мохового и Шренка, махаона, цикады горной, росянки английской, ежеголовника Фриса.

Лесные земли занимают 95% территории и относятся к государственному лесному фонду Кулебакского и Навашиного лесхозов, и к лесам сельскохозяйственных предпри-

тий, объединенных в Кулебакский межхозяйственный лесхоз и не объединенных в межхозяйственный лесхоз в Нава- шинском районе. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (пойменные луга) зани- мают около 5% площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Имеющиеся сведения о численности охраняемых видов птиц на данной территории приведены в таблице 42.
Таблица 42

Численность охраняемых видов птиц на КОТР
«Массив лесов и болот в Степурином и Тешинском лесничествах»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Змееяд	вер.гн.	1 пара	D1
Серый журавль	гн.	10 территориальных пар	D2
Домовый сыч	гн.	1 пара	D2

Кроме перечисленных в таблице видов, здесь вероятно гнездится серый сорокопут (Красная книга РФ), а также обыкновенный зимородок и седой дятел, занесенные в Красную книгу Нижегородской области.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, фактор беспокойства, возможно - браконьерство. Существует потенциальная угроза мелиорации и торфоразработок.

В настоящее время охраняется 12,7% территории в границах 5 памятников природы («Болото Поколевское», «Озеро Поколево», «Озеро Святое Степуринское», «Участки пойменных лесов у с. Мурзицы», «Участки пойменных лесов у с. Шилокша»), после организации спроектированного и зарезервированного Степуринского комплексного заказника под охраной окажется основная часть КОТР, включая все важные для птиц участки.

54. Государственный природный комплексный заказник «Мухтоловский»

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в правобережной пойме реки Теши и на примыкающей к ней территории в Ардатовском районе и занимает 94,0 км². Схема территории показана на рисунке 55.

КОТР включает участок поймы р. Теши, надпойменные террасы и водораздельный склон. Для данной территории характерны песчаные равнины водно-ледникового происхождения с дюнно-бугристыми формами рельефа, слегка осложненными карстом. Две трети территории занимают сосновые боры, в том числе высоковозрастные сосняки - 10% территории. Небольшую площадь (около 1%) занимают ельники, в основном приручьевые, местами переходящие в низинные древесные болота. В северо-западной части имеется небольшой участок высоковозрастного хвойно-широколиственного леса. Около 10% территории занимают производные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте вырубленных сосновых и хвойно-широколиственных лесов. Болота занимают около 7% территории, в том числе низинные - 2%, верховые и переходные - 5%. Около 6% территории приходится на вырубки. Пойма реки Теши характеризуется широким распространением лугов, на долю которых приходится около 10% площади КОТР. Болота, расположенные на территории КОТР, являются клюквенниками. На них отмечена ива черниковидная, занесенная в Красную книгу Нижегородской области.



Рис. 55. Схема КОТР
«Государственный природный комплексный заказник
«Мухтоловский»

Лесные земли занимают около 90% территории и относятся к государственному лесному фонду Мухтоловского лесхоза. На территории заказника, не включенной в состав особо защитных участков, разрешаются добровольно-выборочные рубки главного пользования, рубки ухода и санитарные рубки. Сельхозугодья занимают около 10% площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ.

КОТР служит местом гнездования серого журавля (9 территориальных пар - критерий D2). Здесь гнездится зеленый дятел - вид, нуждающийся в особом контроле за состоянием на территории Нижегородской области.

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.

Границы КОТР совпадают с границами государственного комплексного заказника «Мухтоловский».

55. Территория Личадеевского предотлетного скопления журавлей

Статус КОТР - областной.

КОТР занимает участок долины и надпойменных террас р. Теша на границе Ардатовского и Арзамасского районов. Площадь КОТР - 171,13 км². Схема территории показана на рисунке 56.




Рис. 56. Схема КОТР

«Территория Личадеевского предотлетного скопления журавлей»

ного скопления серых журавлей (30 особей - критерий D2). В восточной части КОТР на оз. Большое Тумановское гнездится более 5 пар чомг (критерий D2).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство.

Территория частично перекрывается с Личадеевским природным комплексным заказником (охраняется около 22% КОТР), на КОТР находится памятник природы «Балахонихинская пещера» (0,3% от площади КОТР). Спроектирован памятник природы «Озеро Тумановское и прилегающий лесной массив».

Территория служит местом предотлет-

56. Озеро Вадское

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена около с. Вад и занимает 5,34 км². Схема территории показана на рисунке 57.

КОТР включает созданную в пойме р. Вадок на месте карстового озера систему рыбообразных прудов площадью около 200 га, а также их водоохранную зону. Система рыбообразных озера прудов состоит из пяти водоемов. Озеро Вадское после постройки дамб превратилось в верхний и самый большой пруд. Озеро имеет площадь 126 га. Его длина - 1,9 км, ширина в приплотинной части - около 1,0 км. Глубина в его приплотинной части - 2-6 м, в единственной сохранившейся на дне озера карстовой воронке-воклине, где имеет место мощный выход подземных вод, глубина 15 м. В то же время имеются обширные мелководья с глубинами 0,3-1,0 м. Озеро характеризуется высокой степенью антропогенного эвтрофирования. Мелководья занимают обширные заросли тростника, рогозов широколистного и узколистного, погруженных водных растений. Озеро служит местом произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: заникилии болотной, частухи Лезеля.

КОТР расположена на землях рыбноводческого совхоза «Вадский».

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 43.



Рис. 57. Схема КОТР «Озеро Вадское»

Орнитологическая характеристика КОТР «Озеро Вадское»

Угрозы деградации данной территории как КОТР: очистка озера Вадское от прибрежно-водной и водной растительности, добыча сапропеля.

В границах памятника природы "Озеро Вадское" охраняется 10,5 % территории.

Необходимые меры охраны: разработать и утвердить паспорт памятника природы, обеспечивающий сохранение орнитокомплекса водоемов.

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Большая выпь	гн.	10 пар	D2
Малая выпь	гн.	10 пар	D2
Чом га	гн.	10 пар	D2
Черношейная поганка	гн.	22 пары	D2
Красноголовый нырок	гн.	25 гнезд	D4
Хохлатая чернеть	гн.	30 выводков	D4
Чирок-трескунок	гн.	18 выводков	-
Кряква	гн.	1-3 выводка	-
Лебедь-шипун	возм.гн.	1 пара	D2
Болотный лунь	гн.	5 пар	-
Черный коршун	гн.	1 пара	-
Лысуха	гн.	20 пар	D2
Камышница	гн.	20 пар	D4
Травник	гн.	5 пар	-
Поручейник	гн.	5 пар	D2
Мородунка	гн.	1 пара	-
Чибис	гн.	?	-
Озерная чайка	гн.	600 пар	D3
Малая чайка	возм.гн.	0-3 пары	-
Черная крачка	гн.	165 пар	D2
Белокрылая крачка	гн.	45 пар	D2
Речная крачка	гн.	40 пар	-
Дроздовидная камышевка	гн.	?	-

57. Чайкино болото

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в 0,5 км к востоку от р.п. Перевоз и имеет площадь 0,52 км². Схема территории показана на рисунке 58.

Территория включает низинное осоковое болото площадью 6,4 га и его водоохранную зону. По происхождению Чайкино болото, по-видимому, представляет собой низинное болото, сформировавшееся на месте заросшего карстового озера. Его длина - 650 м, ширина - 130 м, глубина небольшая - до 1 м в многоводные годы. Водоем окружен полями, рядом (с севера) проходит шоссе Перевоз-Бутурлино. Берега водоема пологие, низкие, топкие. Вдоль берегов полосой, прерывающейся на севере и востоке и сильно расширяющейся на западе, тянутся заросли ив трехтычинковой, пепельной и шерстистопобеговой. Среди прибрежно-водной растительности преобладают ассоциации с доминированием осок острой, омской, пузырчатой и вздутоносой, занимающие более 50% площади. Около 25 % площади

водоема занимают заросли тростника обыкновенного, около 8 % в основном в восточной части водоема - рогоза широколистного. Острова открытой воды, расположенные в восточной части водоема, занимают около 5 % его площади.

КОТР расположена на землях Перевозского конного завода № 151 (ТОО «Племконзавод»).

По результатам учета 1997 года на Чайкином болоте гнездились 350-400 пар озерных чаек (критерий D3). В 1984 году здесь насчитывалось около 2500 пар этих птиц.

Угрозы деградации данной территории как КОТР нуждаются в дополнительном изучении.

Вся территория находится в границах памятника природы «Чайкино болото» и его охранной зоны.




Рис. 58. Схема КОТР «Чайкино болото»

58. Ичалковский бор (НГ-004)

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена на южной ветви р. Пьяны на границе Перевозского и Бутурлинского районов и занимает 44,89 км². Схема территории показана на рисунке 59.




Рис. 59. Схема КОТР «Ичалковский бор»

Территория включает изолированный массив хвойных и широколиственных лесов, расположенный в лесостепной зоне. Лесной массив расположен на правом склоне долины р. Пьяны и характеризуется своеобразным карстовым рельефом. На его территории наблюдаются многочисленные карстовые провалы глубиной до 20-25 м, а также карстовые лога, рвы и желоба. Здесь представлен комплекс фитоценозов сосновых и смешанных лесов, участков дубрав, а также своеобразных сообществ в карстовых провалах и на известняковых обнажениях. Этот лес представляет собой остров реликтовой растительности позднего ледникового времени. Здесь совместно произрастают представители неморальной, бореальной, степной и горной флоры, и среди них многие редкие и реликтовые виды растений. КОТР включает также участок поймы р. Пьяны с лугами, низинными болотами, ивняковыми зарослями. Основные типы местообитаний, распространенных на территории: хвойно-широколиственные леса - 30%, дубравы - 1%, производные сосновые леса, в том числе культуры сосны - 19%, мелколиственные вторичные леса (молодые березняки, осинники, липняки) - 20%, пойменные луга - 25%, низинные болота - 5%.

КОТР служит местом произрастания растений, занесенных в Красную книгу РФ: венерина башмачка настоящего, пыльцеголовника красного, ковыля перистого, местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: ночниц водяной, усатой, прудовой, Брандта и Наттерера, северного кожанка, лесного нетопыря, обыкновенного ушана, полчка, лесной и орешниковой сонь, обыкновенной гадюки, обыкновенной медянки, жужелицы шагреневой, мирмики болотной, дриады, перламутровки малинной (дафны), червонца голубоватого, пятнашки арион, воронца красноплодного, венерина башмачка крапчатого, лилии кудреватой, вишни степной, колокольчика сибирского, голокучника Роберта, диплазия сибирского, наяды морской, занникелии болотной, частухи Лезеля, гроздовников полулунного и виргинского, костенца зеленого, пузырника судетского.

Лесные земли занимают около 70% территории и относятся к государственному лесному фонду Бутурлинского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий не объединенных в межхозяйственный лесхоз.

Орнитологическая характеристика КОТР «Ичалковский бор»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Белый аист	лет.	1 особь	-
Могильник	гн.	1-2 пары*	A1
Черный коршун	гн.	1-2 пары	-
Канюк	гн.	3-4 пары	-
Обыкновенный осоед	гн.	1-2 пары	-
Тетеревятник	гн.	1-2- пары	-
Филин	гн.	1 пара	D1
Длиннохвостая неясыть	гн.	1-2 пары	-
Серая неясыть	гн.	2-4 пары	-
Ушастая сова	гн.	4-6 пар	-
Мохноногий сыч	гн.	2-3 пары	-
Коростель	гн.	30-40 токующихсам цов	A1

* - На КОТР находится единственное обнаруженное в области жилое гнездо могильника, вероятно гнездование второй пары (осенью держатся 6-8 особей этого вида).

аолица 44

ных в межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением Ичалковского бора (936 га) ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (пойменные луга) используются в качестве сенокосов и пастбищ. Земли населенных пунктов - менее 1%. Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 44.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: выборочная рубка леса, высокая рекреационная нагрузка, фактор беспокойства, выпас скота в лесу, разработка полезных ископаемых, браконьерство.

КОТР полностью находится в пределах Ичалковского государственного охотничьего заказника, режим которого не обеспечивает сохранения местообитаний птиц. В границах двух памятников природы («Ичалковский бор», «Озеро Чембасовское») охраняется 24% площади, включая наиболее ценные для птиц участки.

59. Пойма р. Пьяны в Бутурлинском и Сергачском районах

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена вдоль северной ветви р. Пьяны в Сергачском и Бутурлинском районах и занимает 53,77 км². Схема территории показана на рисунке 60.

Территория включает участки низинных черноольховых, тростниковых и осоковых болот, перемежающиеся с ивняковыми зарослями, пойменными лугами, фрагментами пойменных дубрав и многочисленными пойменными и карстовыми водоемами.

Леса занимают около 20% территории и относятся к государственному лесному фонду Бутурлинского и Сергачского лесхозов. Остальная территория - земли сельскохозяйственных предприятий, из них в качестве сенокосов и пастбищ используется приблизительно половина площади, занимаемая лугами.

Территория служит местом остановки на пролете и гнездования большого числа водоплавающих и околоводных птиц. Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 45.




Рис. 60. Схема КОТР «Пойма р. Пьяны в Бутурлинском и Сергачском районах»

Таблица 45
Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Рьяны в Бутурлинском и Сергачском районах»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	5-10 пар	D2
Красношейная поганка	гн.	1-3 пары	D2
Большая выпь	гн.	не менее 10 пар	D2
Малая выпь	гн.	не менее 2 пар	D2
Широконоска	гн.	10-20 выводков	D2
Кряква	гн.	50-100 выводков	D4
Чирок-свистунок	гн.	10-20 выводков	-
Чирок-трескунок	гн.	150-200 выводков	D4
Красноголовый нырок	гн.	15-20 выводков	D4
Хохлатая черныш	гн.	20-30 выводков	D4
Обыкновенный тоголь	лет.	2 особи	-
Болотный лунь	гн.	10-15 пар	-
Серый журавль (в ГПП)	гн.	2-3 территориальных пары	-
Обыкновенный погоныш	гн.	не менее 10 пар	D4
Коростель	гн.	150-300 токующих самцов	-
Большой веретенник	гн.	10-15 пар	D2
Чибис	гн.	20-30 пар	-
Травник	гн.	10-15 пар	D2
Поручейник	гн.	6-12 пар	D2
Турухтан	пр.	?	-
Мородунка	гн.	2-4 пары	-
Бекас	гн.	?	-
Круглоносый плавунчик	пр.	?	-
Озерная чайка	гн. (1984 г.)	500-550 пар	-
	гн. (1997 г.)	60-80 пар	-
Белокрылая крачка	гн.	24-26 пары	D2
Черная крачка	гн.	60-83 пары	D2
Обыкновенный сверчок	гн.	?	-

Значение территории в качестве места остановки водоплавающих и околоводных птиц во время пролета нуждается в изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.

КОТР в основном (95,5%) расположена в границах Бутурлинского государственного охотничьего заказника. Сохранение основных местообитаний птиц обеспечивают два памятника природы («Заболоченная пойма р. Пьяны», «Пойма р. Пьяны у с. Игнатове»).

60. Черноольховое болото с колонией цапель в пойме р. Пьяны около г. Сергач

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в пойме р. Пьяны в 0,7 км к юго-западу от г. Сергач и занимает 8,12 км². Схема территории показана на рисунке 61.



Рис. 61. Схема КОТР

«Черноольховое болото с колонией цапель в пойме р. Пьяны у г. Сергач»

КОТР включает участок поймы и левобережной надпойменной террасы р. Пьяны. Около 50% территории занимают пойменные луга, 12% - низинные черноольховые болота, расположенные в притеррасной пойме, 3% - русло р. Пьяны и пойменные водоемы. На надпойменной террасе расположены леса, в основном культуры сосны, (25% площади КОТР) и техногенные водоемы - отстойники Сергачского сахарного завода (около 10%).

Лесные земли (леса и черноольховые болота) занимают 37% территории и относятся к государственному лесному фонду Сергачского лесхоза и к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования. Луга используются в качестве сенокосов и пастбищ. Отстойники активно используются для очистки сточных вод.

На КОТР существует крупная колония серых цапель, насчитывавшая в 1989 году - 51 пару, в 1997 году - 80 пар (критерий D2).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки в черноольшаниках, загрязнение промышленными стоками.

Территория памятника природы "Черноольховое болото с колонией серых цапель у г. Сергач" занимает 4,2% площади, но в настоящее время значительная часть древостоя в нем вырублена, а колония серых цапель находится вне охраняемой территории.

61. Болото «Мшаниха» в г. Сергач

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в Сергачском районе, на южной окраине г. Сергач и занимает 0,47 км². Схема территории показана на рисунке 62.

КОТР включает зарастающий водоем искусственного происхождения (отстойник Сергачского сахарного завода) и его берега. Зарастание водоема прибрежно-водной растительностью идет по сплавинному типу. Растительность представлена в основном чистой ассоциацией рогоза широколистного. Погруженная водная растительность практически отсутствует. Рогоз образует как нарастающие с берега сплавины, так и отдельные плавучие острова, перемещающиеся по площади водоема под влиянием ветра. Водоем зарос примерно на 35%.

КОТР расположена на землях города Сергач, в настоящее время практически не используется.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 46.

Данная колония озерных чаек - одна из немногих в Нижегородской области, где их численность за период с 1989 г. по 2001 г. практически не изменилась. Чайки гнездятся на рогозовых сплавинах, в основном на тех, которые свободно перемещаются по поверхности водоема, в меньшей степени - на прикрепленных к берегу. Гнезда расположены на нескольких участках с высокой плотностью (более 500 гнезд на 1 га). Чайки кормятся на свалках г. Сергача и на окружающих город полях, уничтожают отбросы и насекомых, наносящих ущерб сельскому хозяйству.




Рис. 62. Схема КОТР

«Болото «Мшаниха» в г.Сергач»

Орнитологическая характеристика КОТР
«Болото «Мшаниха» в г. Сергач»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Черношейная поганка	гн.	4 пары	D2
Кряква	гн.	1-2 выводка	-
Хохлатая чернеть	гн.	12 выводков	-
Красноголовый нырок	гн.	5 выводков	-
Болотный лунь	гн.	1 пара	-
Озерная чайка	гн.	1500 пар	D3
Обыкновенный сверчок	гн.	?	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.

В качестве памятника природы "Водоем с колонией чаек в г. Сергач" и его охранной зоны охраняется около 35% площади КОТР.

62. Овражно-балочные системы Центрального Межпьянья

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на границе Сергачского и Краснооктябрьского районов и занимает 58,30 км². Схема территории показана на рисунке 63.

КОТР включает наиболее крупные и хорошо сохранившиеся участки ковыльно-разнотравных луговых степей и остепненных лугов по склонам оврагов и балок, узкие поймы малых рек и ручьев, а также систему рыбообразных прудов площадью около 90 га. Луговые степи служат местом произрастания ковылей Залесского, красивейшего и перистого, занесенных в Красную книгу РФ, местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: европейского степного сурка, крапчатого суслика, большого тушканчика, шмелей мохового и плодового, ковылей Лессинга, сарептского, волосатика, узколистного, адониса весеннего, астрагалов австрийского и эспарцетного, василька русского, ветреницы лесной, вишни степной, живокости клиновидной, ириса безлистного, козельца пурпурового, колокольчиков волжского и сибирского, коровьяка фиолетового, крес-




Рис. 63. Схема КОТР

«Овражно-балочные системы Центрального Межпьянья»

Таблица 47

Орнитологическая характеристика КОТР
«Овражно-балочные системы Центрального Межпьянья»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	3 пары	-
Черношейная поганка	гн.	2 пары	D2
Черный аист	пр.	1 особь	-
Большая выпь	гн.	7-8 пар	D2
Серая цапля	кормятся	5-15 особей	-
Кряква	гн.	5-10 выводков	-
Чирок-треску но к	гн.	10-15 выводков	-
Красноголовый нырок	гн.	6-8 выводков	-
Обыкновенный гоголь	лет.	6 особей	-
Степной лунь	вер.гн.	0-3 пары	D1
Могильник	лет.	1 особь	-
Орел-карлик	лет.	0-1 особь	-
Змееяд	пр.	1 особь	-
Болотный лунь	гн.	4 пары	-
Малый погоныш	гн.	2-3 пары	D2
Поручейник	гн.	2 пары	-
Травник	гн.	5-6 пар	-
Чибис	гн.	1-3 пары	-
Большой веретенник	гн.	4-6 пар	-
Большой кроншнеп	пр.	?	-
Озерная чайка	гн.	0-2500 пар*	-
Черная крачка	гн.	40 пар	D2
Белокрылая крачка	гн.	28 пар	D2
Обыкновенный сверчок	гн.	9	-
Дроздовидная камышевка	гн.	?	-

тной, скабиозы желтой, спиреи городчатой, чабреца Маршалла, чистеца прямого, льна желтого, ленца полевого, миндаля степного.

Сельхозугодья (степи и луга), занимающие 98,5% площади, используются в качестве пастбищ.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 47.

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.

Сейчас около половины КОТР охраняется в границах Уразовского охотничьего заказника и двух памятников природы ("Степные участки по р. Субой", "Степные участки по склонам правого берега р. Пица") (в том числе памятники природы - 15,5% КОТР). После утверждения еще двух спроектированных памятников природы ("Степные участки по р. Пары", "Степные участки урочища Иске") под охраной окажутся все ценные участки луговых степей.

* - Колония озерных чаек, насчитывавшая в 1983 г. 2500 пар, исчезла к 2000 г.

63. Шумерлинская (НГ-008)

Статус КОТР - международный (всемирный).

КОТР расположена на возвышенности Межпьянье в Пильнинском, Краснооктябрьском и Сеченовском районах и занимает 665,45 км². Схема территории показана на рисунке 64.




Рис. 64. Схема КОТР «Шумерлинская»

Большую часть территории занимают поля кукурузы, зерновых и бобовых, разделенные оврагами, балками и заболоченными поймами малых рек, служащие местом самого крупного в Нижегородской области предотлетного скопления серых журавлей. Включает участок русла р. Суры длиной около 60 км и пойму, занятую производными березняками, осинниками, липняками и заливными лугами. Основные типы местообитаний: производные березники, осинники, липняки на месте пойменных дубрав - 6 %, низинные болота - 1 %, ивняки в поймах рек - 1 %, пойменные луга - 6%, остепненные луга и луговые степи - 15%, пашни - 64%, сельские населенные пункты и дороги - 5%, русло р. Суры и пойменные водоемы - 2%.

КОТР служит местом произрастания ковылей перистого и красивейшего (Красная книга

РФ), местом обитания видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: большого тушканчика, крапчатого суслика, шмеля мохового, адониса весеннего, астрагала австрийского, василька русского,

Таблица 48

Орнитологическая характеристика Шумерлинской КОТР

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Гуси	пр.	30000 особей	А4
	пр.	более 2000 особей (останавливается единовременно)	
Могильник	пр.	1 особь	-
Черный коршун	пр.	100-200 особей	-
Черный коршун	гн.	39 пар	-
Канюк	гн.	19 пар	-
Луговой лунь	гн.	54 пары	-
Полевой лунь	гн.	19 пар	-
Болотный лунь	гн.	35 пар	D2
Ястреб-перепелятник	гн.	4 пары	-
Орел-карлик	гн.	1 пара	D2
Сапсан	гн.	1 пара	D1
Пустельга	гн.	23 пары	D2
Серый журавль	предотлетное скопление	500-1100 особей	B 1.1
	гн.	3-6 территориальных пар	-
Коростель	гн.	150-300 токующих самцов	A1
Озерная чайка	гн.	200-2000 пар	D2
Малая чайка	гн.	25-30 пар	D2
Малая крачка	гн.	82 пары	B2
Речная крачка	гн.	50-60 пар	D2
Белокрылая крачка	гн.	110-140 пар	D2
Кулик-сорока	гн.	15-25 пар	D1 (C1?)

ветреницы лесной, вишни степной, живокости клиновидной, ириса безлистного, ковылей волосатика и узколистного, козельца пурпурового, колокольчиков волжского и сибирского, коровяка фиолетового, крестовника Швецова, кринитарии льнолистной, медуницы узколистной, мытника Кауфмана, наголоватки паутинистой, овсеца пустынного, оносмы простейшей, полыни широколистной, вишни степной, цмина песчаного, чабреца Маршалла, чистеца прямого.

Лесные земли занимают около 6% территории и относятся к государственному лесному фонду Сергачского лесхоза. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточно-го пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают около 85% площади и используются для выращивания сельскохозяйственных культур (64%) в качестве пастбищ (19%) и сенокосов (2%); земли населенных пунктов, дороги и т.п. - 5%.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 48.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: интенсивное сельское хозяйство (удобрения, пестициды), перевыпас скота, браконьерство, фактор беспокойства.

Территориальной охраны нет. Необходима организация территории охраняемого ландшафта регионального (областного) значения («Пойма р. Суры между с. Медяна и с. Ратово и территория предлетного скопления серых журавлей у сел Рыбушкино, Петряксы, Бо*лтинка») с режимом, обеспечивающим сохранение интенсивности ведения сельского хозяйства на существующем уровне, отказ от применения пестицидов, ограничение интенсивности выпаса скота на склонах балок, запрет мелиорации пойм.

64. Пойма р. Пьяна около с. Сарга

Статус КОТР - вероятно международный.

Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Пьяна около с. Сарга»

Таблица 49

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Большая выпь	гн.	1 пара	-
Кряква	гн.	15-30 выводков	-
Чирок-свистун	гн.	2-4 выводка	-
Чирок-трескун	гн.	10-20 выводков	-
Цмро ко носка	гн.	2-4 выводка	-
Связь	возм. гн.	до 15 особей	-
Орел-могильник	?	1 особь	?
Орел-карлик	возм. гн.?	0-1 пара	?
Канюк	гн.	1 пара	-
Черный коршун	гн.	2 пары	-
Перепелятник	гн.	1 пара	-
Болотный лунь	гн.	3-5 пар	-
Степной лунь	гн.	2-4 пары	D1
Луговой лунь	гн.	2-5 пар	-
Полевой лунь	гн.	2 пары	-
Пустельга	гн.	4 пары	-
Чеглок	гн.	1 пара	-
Серый журавль	лет.	до 10 особей	-
Коростель	гн.	30-50 то кующих самцов	A1
Большой веретенник	гн.	16 пар	D2
Травник	гн.	15-20 пар	D2
Поручейник	гн.	14-15 пар	D2
Фифи	лет.	1 особь	-
Турухтан	вер. га.	1 самка	D2?
Дупель	гн.	до 20 выводков	A1
Бекас	гн.	10-40 выводков	-
Чибис	гн.	10-20 пар	-
Белокрылая крачка	гн.	0-150 пар*	D2
Болотная сова	гн.	5 пар	-
Золотистая шурка	возм. гн.	?	?
Луговой конек	гн.	?	-

* - Колония белокрылых крачек формируется не ежегодно.

КОТР находится на границе Красно-октябрьского и Большебодлинского районов, при с. Адашево Большебодлинского района и д. Абрамове Краснооктябрьского района с юга. Площадь КОТР - 12,25 км². Схема территории показана на рисунке 65.




Рис. 65. Схема КОТР
«Пойма р.Пьяна около с. Сарга»

Территория представляет собой массив низинных болот, заливных лугов и залежей в пойме южной ветви р. Пьяны.

Лесные земли занимают около 10% территории и относятся лесам сельхозпредприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. Сельхозугодья занимают около 80% площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ. Около 10% - заболоченные неудобья.

Территория служит местом остановки на пролете большого числа водоплавающих и околоводных птиц, вероятно соответствуя критериям A4 либо B 1.1. Возможна ночевка предлетного скопления серых журавлей.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 49.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: осушительная мелиорация поймы, весенняя охота, браконьерство, фактор беспокойства. Потенциальная угроза - распахивание залежей.

Территориальной охраны нет. Необходима организация территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу Нижегородской области («Пойма р. Пьяны около с. Апраксине, с. Адашево, д. Абрамове»).

65. Пойма р. Оки в Выксунском районе



«Пойма р.Оки в Выксунском районе»

КОТР служит местом концентрации и остановок на пролете большого количества водоплавающих и околоводных птиц, численность которых нуждается в изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: мелиорация поймы, весенняя охота, браконьерство, фактор беспокойства.

В границах 4 памятников природы («Биоценозы поймы р. Оки у п. Внутренний», «Участок хвойных лесов у п. Внутренний», «Рожнов бор», «Озеро Витерево») охраняется 8,1% КОТР.

Статус КОТР — международный (европейский).

КОТР расположена вдоль р. Оки на западе Выксунского района и включает также примыкающие участки Рязанской и Владимирской областей. Площадь КОТР - 282,20 км². Схема территории показана на рисунке 66.

На КОТР представлены заливные луга, пойменные дубравы и производные леса, низинные болота, ивняковые заросли, многочисленные пойменные водоемы, участок русла р. Оки, а также небольшие участки сосновых лесов (в том числе старовозрастных) на правобережной надпойменной террасе р. Оки.

КОТР служит местом обитания выхухоли и произрастания чилима (Красная книга РФ), а также местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: подалирия, шмелей мохового, пластинозубого и Шренка, остроколиницы чернеющей.

Лесные земли занимают около 20% территории и относятся к государственному лесному фонду Выксунского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Выксунский межхозяйственный лесхоз. В лесах (за исключением ООПТ) ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (пойменные луга) занимают 65% площади и используются в качестве сенокосов и пастбищ, русло р. Оки и пойменные водоемы - 9% площади, земли населенных пунктов - менее 1%.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 50.

Таблица 50

Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Оки в Выксунском районе»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Серая цапля	гн.	1-2 пары	-
Серый журавль	гн.	4 территориальные пары	-
Речная крачка	гн.	137 пар	D2
Малая крачка	гн.	89 пар	B2
Черная крачка	гн.	76-148 пар	D2
Белокрылая крачка	гн.	6-8 пар	-
Клинтух	гн.	?	-
Сплюшка	гн.	не менее 2 пар	D2
Сизоворонка	гн.	1-2 пары	D2

66. Водоемы с колонией чайковых около д. Тамболес

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в Высунском районе, в 3 км к юго-западу от районного центра г. Выкса и в 0,6 км к северо-востоку от д. Тамболес. Площадь КОТР - 2,16 км². Схема территории показана на рисунке 67.

КОТР включает небольшие водоемы выработанных торфяных месторождений и окружающие их средне-возрастные сосновые леса. Самый крупный водоем площадью около 10 га расположен в южной части КОТР. Он образовался в результате выработки торфаспособом гидроразмыва. Перемычки в основном разрушены. Осоково-сфагновые сплавины занимают около 50% площади, вокруг них - бордюр из белокрыльника болотного.

КОТР расположена на лесных землях Выксунского лесхоза.

Водоем в южной части КОТР служит местом расположения крупной колонии чайковых птиц, численность которых представлена в таблице. Здесь установлено гнездование 1,3 % от числа озерных чаек, около 6 % от числа малых чаек, 1,6 % от числа речных крачек, обитающих в Нижегородской области. Данные о численности чайковых птиц на КОТР приведены в таблице 51.

Таблица 51

Численность чайковых птиц на КОТР «Водоемы с колонией чайковых около д. Тамболес»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Сизая чайка	гн.	50 пар	-
Озерная чайка	га.	400 пар	D3
Малая чайка	га.	30 пар	D2
Речная крачка	га.	65 пар	D2




Рис. 67. Схема КОТР

«Водоемы с колонией чайковых около д. Тамболес»

Угрозы деградации данной территории как КОТР: нарушение гидрологического режима, сплошные рубки леса по берегам водоемов, весенняя охота.

Территориальной охраны нет, необходимо присвоение статуса территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением о Красной книге Нижегородской области».

67. Водоемы с колониями чайковых около г. Выкса

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в Высунском районе в 2 км к северо-востоку от г. Выкса и занимает 11,24 км². Схема территории показана на рисунке 68.




Рис. 68. Схема КОТР

«Водоемы с колонией чайковых около г. Выкса»

КОТР включает 4 крупные системы водоемов выработанных торфяных месторождений и окружающие их разновозрастные сосновые и мелколиственные леса. Водоемы образовались на месте выработанных в конце XVIII - начале XIX века месторождений торфа и железной руды. Их суммарная площадь - около 90 га. Водоемы имеют разную глубину и степень зарастания прибрежными и водными растениями, а также сфагновыми сплавины. «Озеро» Рязанское в юго-западной части КОТР имеет вид слабо заросшего глубокого озера. На месте основной площади водоемов в северо-восточной части КОТР восстановилось переходное болото.

Территория служит местом обитания обыкновенной гадуки, занесенной в Красную книгу Нижегородской области.

КОТР полностью расположена на лесных землях Выксунского лесхоза.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 52.

Орнитологическая характеристика КОТР
«Водоемы с колониями чайковых около г. Выкса»

Вид	Х а р а к т е р п р е б ы в а н и я	Ч и с л е н н о с т ь	К р и т е р и й в ы д е л е н и я К О Т Р
Чомга	гн.	1-2 пары	-
Черношейная поганка	гн.	4-5 пар	D2
Красношейная поганка	гн.	2-3 пары	D2
Кряква	гн.	2-3 выводка	-
Хохлатая чернеть	гн.	5-7 выводков	-
Обыкновенный гоголь	лет.	до 10 особей	-
Чирок-трескунок	гн.	6-10 выводков	-
Чирок-свистунок	гн.	4-6 выводков	-
Травник	гн.	2-5 пар	-
Большой улит	гн.	1-2 пары	-
Сизая чайка	гн.	10 пар	-
Озерная чайка	гн.	1550-1600 пар	D3
Речная крачка	гн.	8-10 пар	-
Луговой конек	гн.	около 10 пар	-

Угрозы деградации данной территории как КОТР: неизвестны.

Около 31% площади КОТР охраняется в качестве памятника природы "Водоемы с колониями чайковых птиц у г. Выксы".

68. Велетьминский пруд

Статус КОТР - областной.

КОТР примыкает с юга к р.п. Велетьма Кулебакского района и занимает 10,56 км². Схема территории показана на рисунке 69.

КОТР включает систему рыбообразных прудов площадью около 440 га, а также их водоохранную зону, занятую сосновыми лесами. Систему водоемов составляет основной пруд длиной 3750 м и шириной в приплотинной части 1500 м, от которого в северо-западной и в южной частях дамбами отделено по несколько отсеков. На пруду имеется остров длиной 370 м и шириной около 120 м. Обширные заросли осок, тростника, камыша, рогозов располагаются как бордюром вдоль берегов, так и в виде куртин в верхней части пруда.

Таблица 53

Орнитологическая характеристика КОТР «Велетьминский пруд»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	62 пары*	D2
Скопа	вер.гн.	1 пара	D1
Кряква	гн.	10-15 выводков	-
Широконоска	гн.	3-5 выводков	-
Чирок-трескунок	гн.	20-30 выводков	-
Чирок-свистунок	гн.	6-10 выводков	-
Хохлатая чернеть	гн.	40-60 выводков	D4
Красноголовый нырок	гн.	10-15 выводков	D4
Обыкновенный гоголь	гн.	1-3 выводка	-
Черный коршун	гн.	2 пары	-
Болотный лушь	гн.	2 пары	-
Черныш	гн.	1-2 пары	-
Серебристая чайка	гн.	1 пара	-
Сизая чайка	гн.	47 пар	-
Речная крачка	гн.	20 пар	-
Черная крачка	гн.	3-4 пары	-
Белокрылая крачка	гн.	1-2 пары	-
Зимородок	гн.	2 пары	D2

* не менее 15 % от численности чомг, обитающих в Нижегородской области.




Рис. 69. Схема КОТР
«Велетьминский пруд»

Рыбообразные пруды находятся в частной собственности, водоохранная зона относится к лесным землям Выксунского и Кулебакского лесхозов.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 53.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство.

Территориальной охраны нет. Целесообразно присвоение статуса территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением о Красной книге Нижегородской области».

69. Массив лесов и болот в Семиловском лесничестве и примыкающие территории

Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР расположена в южной части Выксунского района, примыкая к границе Нижегородской и Рязанской областей, и занимает 286,19 км². Схема территории показана на рисунке 70.

На КОТР представлены хвойно-широколиственные (в том числе высоковозрастные) леса, производные сосновые боры и мелколиственные леса, переходные, верховые и низинные болота, водоемы выработанных торфяных месторождений, примыкающие участки сельхозугодий.

Территория служит местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: полчка, подалирия, мнемозины, шмеля мохового, зубянки пятилистной.

Лесные земли занимают около 90% территории и относятся к государственному лесному фонду Выксунского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Выксунский межхозяйственный лесхоз. В лесах (за исключением ООПТ) ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (залежи, участки

пашни, пастбища и сенокосы) занимают около 10% площади, земли населенных пунктов -менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 54.




Рис. 70. Схема КОТР
«Массив лесов и болот в Семиловском лесничестве и примыкающие территории»

Таблица 54

Орнитологическая характеристика КОТР

«Массив лесов и болот в Семиловском лесничестве и примыкающие территории»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Степной лунь	гн.	1 пара	D1
Малый подорлик	вер.гн.	1 пара	B2
Перепел	гн.	40-50 токующих самцов	-
Серая куропатка	гн.	2-5 выводков	-
Серый журавль	гн.	31 территориальная пара	D2
	предотлетное скопление	до 50 особей	
Коростель	гн.	40-50 пар	-
Филин	гн.	1 пара	D1

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные рубки леса, браконьерство.
Около 5% территории КОТР охраняется в границах памятника природы ("Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества").

70. Пруды Полдеревского рыбхоза

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в восточной части Выксунского района, примыкает с запада к с. Полдеревка и с. Чупалейка. Площадь КОТР - 9,47 км². Схема территории показана на рисунке 71.

КОТР включает систему рыбозаводных прудов, протянувшихся вдоль р. Велетьма с севера на юг на 4,5 км и их водоохранную зону. Верхний пруд имеет длину 600 м, ширину 500 м; второй пруд - длину около 2 км, ширину в приплотинной части до 400 м. Севернее расположена система более мелких водоемов, окруженных дамбами и частично заполненных водой. На прудах представлен прибрежный пояс осоковых зарослей, местами - участки зарослей тростника и рогозов. На долю водоемов приходится около 15 % площади.

Леса занимают около 15 % территории и относятся к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Выксунский межхозяйственный лесхоз. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий. 70 % территории приходится на долю сельхозугодий,



используемых в основном как пастбища и сенокосы.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 55.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: неизвестны.

Территориальной охраны нет. Целесообразно присвоение статуса территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением о Красной книге Нижегородской области».

Таблица 55
Орнитологическая характеристика КОТР «Пруды Полдеревского рыбхоза»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	1-2 пары	-
Кряква	гн.	10-15 выводков	-
Болотный лунь	гн.	2-3 пары	-
Чирок-трескунок	гн.	15-25 выводков	-
Чирок-свиистунок	гн.	10-15 выводков	-
Хохлатая чернеть	гн.	12-15 выводков	-
Красноголовый нырок	гн.	2-3 выводка	-
Обыкновенный гоголь	лет.	2 особи	-
Поручейник	гн.	1-2 пары	-
Черная крачка	гн.	30 пар*	D2
Белокрылая крачка	гн.	3 пары	-

* - около 2 % от числа черных крачек, обитающих в Нижегородской области.

71. Пруды Илевского рыбхоза

Статус КОТР - областной.

КОТР находится в восточной части Вознесенского района, к северо-востоку от районного центра р.п. Вознесенское в 11 км, примыкает к с. Илев с юга. Площадь КОТР - 21,72 км². Схема территории показана на рисунке 72.

Система рыбообразованных прудов протянулась с северо-востока на юго-запад на 4,3 км вдоль с. Илев и занимает площадь около 270 га. Степень зарастания прудов различна, на них представлены участки зарослей осок, тростника, рогоза, затопленные усыхающие ивняки. Пруды окружены разновозрастными хвойными и мелколиственными лесами, на берегах встречаются участки луговой растительности.

Леса занимают около 70% территории и относятся к государственному лесному фонду Вознесенского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных




Таблица 56

Орнитологическая характеристика КОТР «Пруды Илевского рыбхоза»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	19 пар*	D2
Черношейная поганка	гн.	2 пары	D2
Серая цапля	вер.гн.	5-10 пар	-
Большая выпь	гн.	6 пар	D2
Кряква	гн.	20-25 выводков	-
Чирок-свиистунок	гн.	10-15 выводков	-
Чирок-трескунок	гн.	15-20 выводков	-
Свиязь	гн.	1-4 выводка	-
Красноголовый нырок	гн.	5-7 выводков	-
Хохлатая чернеть	гн.	20-22 выводка	-
Скопа	гн.	1 пара	D1
Черный коршун	гн.	2 пары	-
Болотный лунь	гн.	2 пары	-
Поручейник	гн.	2 пары	-
Травник	гн.	1 пара	-
Черныш	гн.	1 пара	-
Перевозчик	гн.	1 пара	-
Озерная чайка	гн.	50 пар	-
Сизая чайка	гн.	3 пары	-
Речная крачка	гн.	10 пар	-

* - около 5 % от численности чомг, обитающих в Нижегородской области.

Рис. 72. Схема КОТР «Пруды Илевского рыбхоза»


предприятий, объединенных в Вознесенский межхозяйственный лесхоз. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. На берегах прудов местами выпасается скот.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 56.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство.

Территориальной охраны нет. Целесообразно присвоение статуса территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением о Красной книге Нижегородской области».

72. Пойма р. Мокша и территория предотлетного скопления серых журавлей около п. Хохлиха и п. Шаприха



Статус КОТР - международный (европейский).

КОТР находится на юго-восточной границе Вознесенского района, часть КОТР - на территории Республики Мордовия. Площадь КОТР - 246,61 км². Схема территории показана на рисунке 73.

На КОТР представлены обширные пойменные луга с участками черноольховых и осоковых болот, ивняковых зарослей, пойменных лесов и многочисленными водоемами, а также примыкающие поля и участки леса на надпойменной террасе.

Рис. 73. Схема КОТР «Пойма р. Мокша и территория предотлетного скопления серых журавлей около п.Хохлиха и п. Шаприха»

Таблица 57

Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Мокша и территория предотлетного скопления серых журавлей около п. Хохлиха и п. Шаприха»

Лесные земли занимают около 20% территории и относятся к государственному лесному фонду Вознесенского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, объединенных в Вознесенский межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройство. Сельхозугодья, используемые как пастбища, сенокосы, пашни, занимают около 60% площади; неудобья (осоковые болота, ивняковые заросли) - 15%, водоемы - 4%, земли населенных пунктов - около 1%.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 57. Территория служит местом концентрации и остановки во время пролета большого числа водоплавающих и околоводных птиц, численность которых требует изучения.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: не установлены.

Около 1,5% площади КОТР охраняется в границах ГПП («Участок леса у реки Сатис»).

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Чомга	гн.	1-2 пары	-
Серая цапля	гн.	до 10 пар	-
Большая выпь	гн.	10-15 пар	D2
Кряква	гн.	6-10 выводков	-
Чирок-треску но к	гн.	15-20 выводков	-
Черный коршун	гн.	4-6 пар	-
Канюк	гн.	2-3 пары	-
Орлан-белохвост	возм.гн.	1 пара	D1?
Обыкновенный осоед	гн.	1-2 пары	-
Болотный лунь	гн.	10-15 пар	D2
Полевой лунь	гн.	1-3 пары	-
Луговой лунь	гн.	8-10 пар	•
Пустельга	гн.	6-10 пар	-
Чеглок	гн.	3-5 пар	-
Перепел	гн.	100-150 токующихсамцов	-
Серый журавль	гн.	3 территориальные пары	-
	предотлетное скопление	80-200 особей	D2
Коростель	гн.	80-100 токующихсамцов	A1
Кулик-сорока	гн.	6-10 пар	D1 (C1?)
Мородунка	гн.	2-4 пары	-
Чибис	гн.	20-40 пар	-
Бекас	гн.	30-50 пар	-
Поручейник	гн.	5-10 пар	D2
Травник	гн.	8-10 пар	D2
Малый зуек	гн.	6-10 пар	-
Белокрылая крачка	гн.	100-120 пар	D2
Малая крачка	гн.	10-12 пар	D1
Ушастая сова	гн.	5-7 пар	-
Болотная сова	гн.	2-3 пары	-
Зимородок	гн.	3-6 пар	D2
Золотистая шурка	гн.	10-12 пар	D2
Береговушка	гн.	1500-2000 пар	D3
Садовая овсянка	гн.	100-150 пар	B2

73. Урочище «Скит» и прилегающий лесной массив

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на стыке Дивеевского и Первомайского районов, основная часть территории расположена в Дивеевском районе, небольшая часть - в Первомайском. Площадь КОТР - 30,68 км². Схема территории показана на рисунке 74.

На КОТР представлен массив старовозрастных хвойно-широколиственных, широколиственных и сосновых лесов. Территория служит местом обитания обыкновенной медянки и обыкновенной гадюки, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.




Рис. 74. Схема КОТР «Урочище «Скит» и прилегающий лесной массив»

Лесные земли занимают практически всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Вознесенского и Первомайского лесхозов. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством.

КОТР - единственное известное в настоящее время в Нижегородской области место гнездования мухоловки-белошейки (критерий D2). Здесь гнездится клинтух, также занесенный в Красную книгу Нижегородской области.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса.

В качестве памятника природы "Урочище Скит и прилегающий лесной массив" охраняется 35,4% площади КОТР.

74. Леса в истоке р. Алатырь

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в Первомайском районе, в 4,5 км к северо-востоку от г. Первомайска и занимает 31,63 км². Схема территории показана на рисунке 75.

На КОТР представлен участок разновозрастных хвойно-широколиственных, сосновых и мелколиственных лесов.

Леса занимают 97 % территории и относятся к государственному лесному фонду Первомайского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки главного и промежуточного пользования, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (в основном залежи) занимают около 3 % площади.

КОТР служит местом гнездования 2 пар филинов (критерий D.1).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, фактор беспокойства.

На двух памятниках природы («Участок леса по р. Сухой Алатырь», «Участок хвойно-широколиственного леса в кварталах 149, 150 Сатисского лесничества») охраняются 15,4% территории.




Рис. 75. Схема КОТР «Леса в истоке р. Алатырь»

75. КОТР «Разинская»

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена в южной части Лукояновского района, в 1 км к югу от р.п. им. Степана Разина и занимает 53,5 км². Схема территории показана на рисунке 76.

Территория включает участок долины и надпойменных террас р. Алатырь. В пойме преобладают луга с участками ивняковых зарослей и небольшими заболоченностями. Левобережную притеррасную пойму занимают низинные черноольховые болота. На левой надпойменной террасе - массив разновозрастных хвойно-широколиственных, сосновых и мелколиственных лесов. На правой террасе - поля и залежи, а также массив дубрав и их производных (липняков и осинников). Дубравы служат местом произрастания хохлатки Маршалла и зубянки пятилистной, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают 64% территории и относятся к государственному лесному фонду Разинского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В лесах (за исключением ООПТ) ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки пивного и промежуточного пользования. Сельхозугодья (залежи, участки пашни, пастбища и сенокосы) занимают 34% площади, водоемы - около 2%, земли населенных пунктов - менее 1%.

КОТР служит местом гнездования глобально редкого вида - большого подорлика (1 пара - критерий D1), здесь также гнездятся клинтух (Красная книга Нижегородской области) и зеленый дятел (вид, нуждающийся в особом контроле за состоянием на территории области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, мелиорация поймы, браконьерство, фактор беспокойства.

На трех памятниках природы («Дубрава Ленинского лесничества», «Панзельский пруд и сосновые леса в его окрестностях», «Кленово-липовый лес у д. Санки») и их охранных зонах охраняется около 12% территории.




Рис. 76. Схема КОТР «Разинская»

76. Дубрава Коммунарского лесничества

Статус КОТР - областной.

КОТР расположена на юго-западе Починковского района в 3 км к югу от пос. Коммунар и занимает 34,7 км². Схема территории показана на рисунке 77.




Рис. 77. Схема КОТР
«Дубрава Коммунарского лесничества»

территории нуждается в дополнительном изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, мелиорация поймы р. Иреть, браконьерство.

Для охраны лесного массива спроектирован и зарезервирован памятник природы «Дубрава Коммунарского лесничества», занимающий около 60% КОТР.

На КОТР представлен массив широколиственных лесов, включающий наиболее ценные сохранившиеся в Нижегородской области фрагменты старовозрастных водораздельных дубрав, не утративших способность к самовосстановлению. Опушки занимают луга и залежи с участками кустарников (в поймах - ивняков, по склонам оврагов - лещины и др.). Дубрава служит местом обитания мнемозины (Красная книга РФ), произрастания лунника оживающего и хохлатки Маршалла (Красная книга Нижегородской области).

Леса занимают 63 % территории и относятся к государственному лесному фонду Починковского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. Сельхозугодья (залежи и луга) занимают около 30% площади, используются в основном в качестве пастбищ, отдельные участки - сенокосов. На долю неудобий (оврагов и заболоченностей) приходится около 6% площади, населенных пунктов - 1%, водоемов - менее 1 %.

На КОТР вероятно гнездование глобально редкого вида - степного луя (1 пара - критерий D1), гнездится обыкновенный сверчок (Красная книга Нижегородской области). Орнитологическая значимость тер-

77. Пойма р. Рудня и примыкающие территории

Статус КОТР - международный (европейский)

КОТР расположена в Починковском районе, в бассейне р. Рудня - правого притока р. Алатырь. Площадь КОТР - 132,36 км². Схема территории показана на рисунке 78.

Территория включает участки луговых степей и остепненных лугов, пойменные луга и низинные болота, местами смелиорированные. На склонах оврагов и балок представлены хорошо сохранившиеся среднерусские луговые степи, имеющие наряду со степными участками по рекам Субой и Пица важнейшее значение в Нижегородской области. На степных участках отмечено не менее 180 видов растений, в том числе два вида, занесенные в Красную книгу

РФ: ковыли красивейший и перистый; 27 видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: адонис весенний, астрагал австрийский, василек русский, ветреница лесная, вишня степная, живокость клиновидная, ирис безлистный, ковыль волосатик, ковыль узколистный, козелец пурпуровый, колокольчик волжский, колокольчик сибирский, коровяк фиолетовый, крестовник цельнолистный, крестовник Швецова, кринитария льнолистная, ленец безприцветниковый, ломонос прямой, медунца узколистная, мытник Кауфмана, овсец пустынный, подмаренник красильный, полынь армянская, серпуха разнолистная, спирея городчатая, чабрец Маршалла, чистец прямой; 5 видов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Нижегородской области: вероника простертая, горечавка перекрестнолистная, осока горная, остролодочник волосистый, ястребинка ядовитая. Степи служат местообитанием редких видов животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: крапчатого суслика, махаона, шмелей мохового и плодового.

Леса занимают около 10% территории и относятся к государственному лесному фонду Починковского лесхоза, и к лесам сельскохозяйственных предприятий, не объединенных в межхозяйственный лесхоз. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий. Сельхозугодья (луга, луговые степи и залежи) занимают около 85% площади, используются в основном в качестве пастбищ, отдельные участки - сенокосов. На долю заболоченных неудобий приходится около 3% площади, населенных пунктов - 1,5%, водоемов - менее 1%.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в таблице 58.



Рис. 78. Схема КОТР «Пойма р. Рудня и примыкающие территории»

Угрозы деградации данной территории как КОТР: перевыпас скота, весенняя охота, возможная мелиорация поймы.

В качестве памятника природы «Степные участки по р. Рудня» охраняется 3,3 % территории, спроектированы еще 3 памятника природы «Дубрава у с. Пеля-Хованская», «Степи урочища Шихан», «Пойма р. Рудня между с. Дивеев Усад и с. Маресево», а также расширение существующего памятника природы.

Таблица 58
Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Рудня и примыкающие территории»

Вид	Характер пребывания	Численность	Критерий выделения КОТР
Гуси	пролет	6000-10000	B1.1
Кряква	гн.	15-20 выводков	-
Шилохвость	гн.	?	-
Чирок-трескун	гн.	15-20 выводков	-
Чирок-свистунок	гн.	1-2 выводка	-
Хохлатая черныш	гн.	2-3 выводка	-
Широконоска	гн.	1-2 выводка	-
Свиязь	лет.	4 особи	-
Степной лунь	гн.	1-3 пары	D1
Болотный лунь	гн.	3-4 пары	-
Луговой лунь	гн.	8-12 пар	-
Полевой лунь	гн.	2 пары	-
Канюк	гн.	4-5 пар	-
Черный коршун	гн.	3-5 пар	-
Пустельга	гн.	4-6 пар	-
Перепел	гн.	40-50 то кующих самцов	-
Серая куропатка	гн.	15-20 токующих самцов	-
Коростель	гн.	40-50 пар	(A1)
Обыкновенный погonyш	гн.	?	-
Поручейник	гн.	3-5 пар	D2
Большой веретенник	гн.	1-2 пары	-
Чибис	гн.	20-50 пар	D4
Травник	гн.	2-5 пар	-
Белокрылая крачка	гн.	20 пар	D2
Болотная сова	гн.	1 пара	-
Золотистая шурка	гн.	не менее 25 пар	D2
Обыкновенный сверчок	гн.	2-4 пары	-
Береговушка	гн.	400-500 пар	-
Садовая овсянка	гн.	более 100 пар	B2
Луговой конек	гн.	3-10 пар	-

Вероятно областные КОТР

В отличие от других КОТР, бесспорно имеющих важное значение для птиц, по крайней мере, в масштабах области, ключевую роль этих территорий необходимо подтвердить. Поэтому в мы приводим не полные их характеристики, а лишь аннотированный перечень. Расположение этих территорий показано на рис. 1, границы нуждаются в уточнении.

78. Пойма р. Ветлуги между р.п. Красные Баки и п. Лесной Курорт

Краснобаковский район. Площадь - 12 км². Представлены вторичная растительность поймы (луга, средневозрастные березняки и осинники), пойменные водоемы. Вероятно гнездятся: речная крачка - 30-50 пар, малая крачка - 20-40 пар. Колония крачек не найдена, предположительная численность определена по результатам наблюдений за кормящимися и отдыхающими птицами. Территориальной охраны нет.

79. Пойма р. Ветлуги между д. Лысицы и д. Кладовка

Краснобаковский и Воскресенский районы. Площадь - 30 км². Представлены вторичная растительность поймы (луга, средневозрастные березняки и осинники), пойменные водоемы. Вероятно гнездятся: речная крачка - 30-50 пар, малая крачка - 20-40 пар. Колония крачек не найдена, предположительная численность определена по результатам наблюдений за кормящимися и отдыхающими птицами. Территориальной охраны нет.

80. Пруд в с. Роженцово

Шарангский район, северо-восточная окраина с. Роженцово. Площадь - 1 км². Пруд площадью 7,44 га с постоянным гидрологическим режимом. В 1986 г. гнезилось 20 пар черных крачек. Территориальной охраны нет.

81. Острова Осаповы горы на Горьковском водохранилище

Сокольский район. Площадь - 10 км². Высокие песчаные острова с разреженным молодым сосновым лесом. Вероятно гнездится серебристая чайка - 5-10 пар. Колония чаек не найдена, предположительная численность определена по результатам наблюдений за кормящимися и отдыхающими птицами. Территориальной охраны нет.

82. Участок Горьковского водохранилища около д. Ведерницы и Кудрино

Сокольский район. Площадь - 2 км². Вероятно областной. Мелководный залив водохранилища. Вероятно гнездится малая чайка - 30-35 пар. Колония чаек не найдена, предположительная численность определена по результатам наблюдений за кормящимися и отдыхающими птицами. Территориальной охраны нет.

83. Рыбозаводные пруды около д. Новоликеево Кстовского р-на

Площадь - 7 км². Система рыбозаводных прудов. Место гнездования большого числа водоплавающих и околоводных птиц (поганок, уток и др.). Учеты численности не проведены. Территориальной охраны нет.

84. Пойма р. Суры от устья р. Пьяна до д. Княжиха

Пильнинский район. Площадь - 70 км². Массив измененных рубками пойменных лесов с участками низинных болот, заливных лугов и пойменными водоемами. Гнездятся: малая крачка - 5-6 пар, черная крачка - 20-30 пар, серый журавль - 4 территориальные пары. Территориальной охраны нет.

85. Пойма р. Пьяны около с. Гагино

Площадь - 9 км². Массив пойменных лугов, используемых в качестве сенокосов и пастбищ. Вероятно гнездится белокрылая крачка - 15 пар. Колония крачек не найдена, предположительная численность определена по результатам наблюдений за кормящимися и отдыхающими птицами. Территориальной охраны нет.

Список орнитофауны Нижегородской области

№	Вид	Степень охраны	Характер пребывания
Отряд Гагары - Gaviiformes Семейство Гагаровые - Gaviidae			
1.	Краснозобая гагара - <i>Gavia stellata</i> (Pontopp.)	-	нерег. пр., лет.
2.	Чернозобая гагара - <i>G. arctica</i> (L.)	2,3	гн.
Отряд Поганки - Podicipitiformes Семейство Поганковые - Podicipedidae			
3.	Малая поганка- <i>Podiceps ruficollis</i> (Pall.)	-	ел.зал.
4.	Черношейная поганка - <i>P. nigricollis</i> C. L.	3	гн.
5.	Красношейная поганка- <i>P. auritus</i> (L.)	3	гн.
6.	Серошекая поганка - <i>P. grisegena</i> (Bodd.)	3	нерег. гн.
7.	Большая поганка - <i>P. cristatus</i> (L.)	3	гн.
Отряд Пеликанообразные - Pelecaniformes			
Семейство Пеликановые - Pelecanidae			
8.	Розовый пеликан - <i>Pelecanus onocrotallus</i> L.	2	ел.зал.
Семейство Баклановые - Phalacrocoracidae			
9.	Большой баклан - <i>Phalacrocorax carbo</i> (L.)	-	ел.зал.
Отряд Листообразные - Ciconiiformes			
Семейство Цаплевые - Ardeidae			
10.	Большая выпь - <i>Botaurus stejaris</i> (L.)	4	гн.
11.	Малая выпь- <i>Ixobrychus minutus</i> (L.)	3	гн..
12.	Большая белая цапля - <i>Egretta alba</i> (L.)	-	рег. зал.
13.	Малая белая цапля - <i>Egretta garzetta</i> (L.)	-	ел.зал.
14.	Серая цапля - <i>Ardea cinerea</i> L.	3	гн.
Семейство Аистовые - Ciconiidae			
15.	Белый аист- <i>Ciconia ciconia</i> (L.)	3	нерег. гн.
16.	Черный аист- <i>C. nigra</i> (L.)	2,3	вер. гн. (пр.)
Семейство Фламинговые - Phoenicopteridae			
17.	Фламинго - <i>Phoenicopus roseus</i> Pall.	2	ел.зал.
Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes Семейство Утиные - Anatidae			
18.	Краснозобая казарка - <i>Rufibrenta ruficollis</i>	2	пр.
19.	Белошекая казарка - <i>Branta leucopsis</i> (Bechst.)	-	ел.зал.
20.	Черная казарка - <i>B. bernicla</i> (L.)	2	пр.
21.	Серый гусь- <i>Anser anser</i> (L.)	3	пр. (ранее гн.)
22.	Белолобый гусь- <i>A. albifrons</i> (Scop.)	-	пр., лет.
23.	Гуменник- <i>A. fabalis</i> (Lath.)	-	пр.
24.	Пискулька - <i>A. erythropus</i> (L.)	1,2	пр., лет.
25.	Белый гусь - <i>Chen caerulescens</i> (L.)	-	ел.зал.
26.	Лебедь-шипун - <i>Cygnus olor</i> (Gm.)	3	нерег. гн.
27.	Лебедь-кликун - <i>C. cygnus</i> (L.)	3	пр.
28.	Пеганка - <i>Tadorna tadorna</i> (L.)	-	рег. зал.
29.	Кряква - <i>Anas platyrhynchos</i> L.	-	гн.
30.	Чирок-свистунок - <i>A. crecca</i> L.	-	гн.
31.	Серая утка - <i>A. strepera</i> L.	3	гн.
32.	Свиязь - <i>A. penelope</i> L.	4	гн.
33.	Шилохвость - <i>A. acuta</i> L.	-	гн.
34.	Чирок-трескунок - <i>A. querquedula</i> L.	-	гн.
35.	Мраморный чирок- <i>A. anqustirostris</i> Menetr.	1,2	ел.зал.
36.	Широконоска - <i>A. clypeata</i> L.	4	гн.
37.	Красноносый нырок- <i>Netta rufina</i> (Pall.)	-	ел.зал.
38.	Красноглазый нырок- <i>Aythya ferina</i> (L.)	4	гн.
39.	Белоглазый нырок- <i>A. nyroca</i> (Guld-)	1,2	рег. зал., лет.
40.	Хохлатая черныш - <i>A. fuligula</i> (L.)	-	гн.

№	Вид	Степень охраны	Характер пребывания
41.	Морская чернеть - <i>A. marila</i> (L.)	-	пр.
42.	Гага обыкновенная - <i>Somateria mollissima</i> (L.)	-	ел.зал.
43.	Морянка - <i>Clanula hyemalis</i> (L.)	-	пр.
44.	Обыкновенный гоголь - <i>Bucephala clangula</i> (L.)	4	гн.
45.	Синьга - <i>Melanitta nigra</i> (L.)	-	пр.
46.	Обыкновенный турпан - <i>M. fusca</i> (L.)	-	пр., лет.
47.	Луток - <i>Mergus albellus</i> (L.)	3	гн.
48.	Длинноносый крохаль - <i>M. serrator</i> L.	3	нерег. гн.
49.	Большой крохаль - <i>M. merganser</i> (L.)	3	пр. (вер. гн.)
50.	Савка - <i>Oxyura leucorhynchos</i> (Scopoli)	1,2	ел.зал.
51.	Мандаринка - <i>Aix galericulata</i> (L.)	2	ел.зал.
Отряд Хищные птицы - Falconiformes			
Семейство Ястребиные - Accipitridae			
52.	Скопа - <i>Pandion haliaetus</i> (L.)	2,3	гн.
53.	Обыкновенный осоед - <i>Pernis apivorus</i> (L.)	4	гн.
54.	Черный коршун - <i>Milvus migrans</i> (Gm.)	-	гн.
55.	Полевой лунь - <i>Circus cyaneus</i> (L.)	4	гн.
56.	Степной лунь - <i>C. macrourus</i> (Gm.)	1,2,3	гн.
57.	Луговой лунь - <i>C. pygargus</i> (L.)	4	гн.
58.	Болотный лунь - <i>C. aeruginosus</i> (L.)	-	гн.
59.	Тетеревиатник - <i>Accipiter gentilis</i> (L.)	-	гн.
60.	Перепелятник - <i>A. nisus</i> (L.)	-	гн.
61.	Зимняк - <i>Buteo lagopus</i> (Pontopp.)	-	пр.
62.	Канюк - <i>B. buteo</i> (L.)	-	гн.
63.	Змееяд - <i>Circus gallicus</i> (Gm.)	2,3	гн.
64.	Орел-карлик - <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gm.)	3	гн.
65.	Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pall.	1,2,3	гн.
66.	Малый подорлик - <i>A. pomarina</i> C.L.Brehm	2	ел.зал.
67.	Могильник - <i>A. heliaca</i> Sav.	1,2,3	гн.
68.	Беркут - <i>A. chrysaetos</i> (L.)	2,3	гн.
69.	Орлан-белохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i> (L.)	1,2,3	гн.
70.	Черный гриф - <i>Aegypius monachus</i> (L.)	1,2	ел.зал.
71.	Белоголовый сип - <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl)	2	ел.зал.
Семейство Соколиные - Falconidae			
72.	Кречет - <i>Falco rusticolus</i> L.	2	ел.зал.
73.	Балобан - <i>F. cherrug</i> J.E. Grau	2	рег. зал.
74.	Сапсан - <i>F. peregrinus</i> Tunst.	2,3	гн.
75.	Чеглок - <i>F. subbuteo</i> (L.)		гн.
76.	Дербник - <i>F. columbarius</i> (L.)	3	гн.
77.	Кобчик - <i>F. vespertinus</i> (L.)	3	гн.
78.	Обыкновенная пустельга - <i>F. tinnunculus</i> (L.)	4	гн.
Отряд Курообразные - Galliformes			
Семейство Тетеревиные - Tetraonidae			
79.	Белая куропатка - <i>Lagopus lagopus</i> (L.)	2,3	зим. (ранее гн.)
80.	Тетерев - <i>Lyrurus tetrix</i> (L.)	-	гн.
81.	Глухарь - <i>Tetrao urogallus</i> L.	-	гн.
82.	Рябчик - <i>Tetrastes bonasia</i> (L.)	-	гн.
Семейство Фазановые - Phasianidae			
83.	Серая куропатка - <i>Perdix perdix</i> (L.)	4	гн.
84.	Перепел - <i>Coturnix coturnix</i> (L.)	4	гн.
Отряд Журавлеобразные - Gruiformes			
Семейство Журавлиные - Gruidae			
85.	Серый журавль - <i>Grus grus</i> (L.)	3	гн.
86.	Стерх - <i>G. leucogeranus</i> Pall.	1,2	ел.зал.

№	Вид	Степень охраны	Характер пребывания
Семейство Пастушковые - Rallidae			
87.	Пастушок - <i>Rallus aquaticus</i> L.	3	гн.
88.	Погоныш - <i>Porzana porzana</i> (L.)	-	гн.
89.	Малый погоныш - <i>P. parva</i> (Scop.)	3	гн.
90.	Погоныш-крошка - <i>P. pusilla</i> (Pall.)	3	вер. гн.
91.	Коростель - <i>Crex crex</i> (L.)	1. 4	гн.
92.	Камышница - <i>Gallinula chloropus</i> (L.)	-	гн.
93.	Лысуха - <i>Fulca atra</i> L.	3	гн.
Семейство Дрофиные - Otidae			
94.	Дрофа - <i>Otis tarda</i> L.	1. 2, 3	исч.
95.	Стрепет - <i>O. tetrix</i> (L.)	1. 2, 3	исч.
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes			
Семейство Ржанковые - Charadriidae			
96.	Тулес - <i>Pluvialis squatarola</i> (L.)	-	пр.
97.	Золотистая ржанка - <i>P. apricaria</i> (L.)	-	пр.
98.	Галстучник - <i>Charadrius hiaticula</i> L.: -	-	пр.
99.	Малый зуек - <i>Ch. dubius</i> Scop.	-	гн.
100.	Морской зуек - <i>Ch. alexandrinus</i> L.	-	ел. зал.
101.	Хрустан - <i>Eudromias morinellus</i> L.	-	ел. зал.
102.	Чибис - <i>Vanellus vanellus</i> (L.)	-	гн.
Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae			
103.	Ходулочник - <i>Himantopus himantopus</i> L.	2	гн.
104.	Шилоклювка - <i>Recurvirostra avosetta</i> L.	2	рег. зал.
Семейство Кулики-сороки - Haematopodidae			
105.	Кулик-сорока - <i>Haematopus ostralegus</i> L.	2, 3	гн.
Семейство Плавунчиковые - Phalaropidae			
106.	Круглоносый плавунчик - <i>Phalaropus lobatus</i> (L.)	-	пр.
107.	Плосконосый плавунчик - <i>Ph. fulicarius</i> (L.)	-	ел. зал.
Семейство Бекасовые - Scolopacidae			
108.	Камнешарка - <i>Actinaria interpres</i> (L.)	-	ел. зал.
109.	Черныш - <i>Tringa ochropus</i> L.	-	гн.
110.	Фифи - <i>T. glareola</i> L.	3	гн.
111.	Большой улит - <i>T. nebularia</i> (Gunn.)	-	гн.
112.	Травник - <i>T. totanus</i> L.	4	гн.
113.	Щеголь - <i>T. erythropus</i> (Pall.)	-	пр.
114.	Поручейник - <i>T. stagnitilis</i> (Bechst.)	3	гн.
115.	Перевозчик - <i>Actitis hypoleucos</i> (L.)	-	гн.
116.	Мородунка - <i>Xenus cinereus</i> (Guld.)	3	гн.
117.	Турухтан - <i>Phylomachus pugnax</i> (L.)	3	гн.
118.	Кулик-воробей - <i>Calidris minuta</i> (Leisl.)	-	пр.
119.	Белохвостый песочник - <i>C. temminckii</i> (Leisl.)	-	пр.
120.	Краснозобик - <i>C. ferruginea</i> (Pontopp.)	-	пр.
121.	Чернозобик - <i>C. alpina</i> (L.)	-	пр.
122.	Исландский песочник - <i>C. canutus</i> (L.)	-	ел. зал.
123.	Песчанка - <i>C. alba</i> (Pall.)	-	пр.
124.	Грязовик - <i>Limicola falcinellus</i> (Pontopp.)	-	пр.
125.	Гаршнеп - <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brunn.)	-	пр.
126.	Бекас - <i>Gallinago gallinago</i> (L.)	-	гн.
127.	Дупель - <i>G. media</i> (Lath.)	1, 4	гн.
128.	Вальдшнеп - <i>Scolopax rusticola</i> L.	-	гн.
129.	Большой кроншнеп - <i>Numenius arquata</i> (L.)	2, 3	гн.
130.	Средний кроншнеп - <i>N. phaeopus</i> (L.)	-	гн.
131.	Большой веретенник - <i>Limosa limosa</i> (L.)	4	гн.
132.	Малый веретенник - <i>L. lapponica</i> (L.)	-	ел. зал.

№	Вид	Степень охраны	Характер пребывания
Семейство Поморниковые - Stercorariidae			
133.	Средний поморник - <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temm.)	-	ел.зал.
134.	Короткохвостый поморник - <i>S. parasiticus</i> (L.)	-	ел.зал.
Семейство Чайковые - Laridae			
135.	Черноголовый хохотун - <i>Larus ichthyæetus</i> Pall.	2	рег. зал., лет.
136.	Черноголовая чайка - <i>L. melanocephalus</i> Temm.	-	рег. зал., лет.
137.	Малая чайка - <i>L. minutus</i> Pall.	3	гн.
138.	Озерная чайка - <i>L. ridibundus</i> L.	4	гн.
139.	Клуша - <i>L. fuscus</i> L.	4	нерег. гн.
140.	Серебристая чайка - <i>L. argentatus</i> Pontopp.	3	гн.
141.	Восточная клуша - <i>L. heuglini</i> Bree	3	гн.
142.	Хохотунья - <i>L. cachinnans</i> Pall.	3	гн.
143.	Бургомистр - <i>L. hyperboreus</i> Gunn.	-	ел.зал.
144.	Морская чайка - <i>L. marinus</i> L.	-	ел.зал.
145.	Сизая чайка - <i>L. canus</i> L.	-	гн.
146.	Вилохвостая чайка - <i>Xema sabini</i> (Sabine)	-	ел.зал.
147.	Черная крачка - <i>Chlidonias niger</i> (L.)	3	гн.
148.	Белокрылая крачка - <i>Ch. leucopterus</i> (Temm.)	3	гн.
149.	Речная крачка - <i>Sterna hirundo</i> (L.)	3	гн.
150.	Малая коачка - <i>S. albifrons</i> Pall.	2.3	гн.
Семейство Чистиковые - Alcidae			
151.	Толстоклювая кайра - <i>Uria lomvia</i> (L.)	-	ел.зал.
Отряд Голубеобразные - Columbiformes			
Семейство Рябковые - Pterocletidae			
152.	Саджа - <i>Syrhaptes paradoxus</i> (Pall.)	-	ел.зал.
Семейство Голубиные - Columbidae			
153.	Вяхирь - <i>Columba palumbus</i> L.	-	гн.
154.	Клинтух - <i>C. oenas</i> L.	3	гн.
155.	Сизый голубь - <i>C. livia</i> L.	-	гн.
156.	Кольчатая горлица - <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivald.)	-	гн.
157.	Обыкновенная горлица - <i>S. turtur</i> (L.)	-	гн.
Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes Семейство Кукушкиные -- Cuculidae			
158.	Обыкновенная кукушка - <i>Cuculus canorus</i> L.	-	гн.
159.	Глухая кукушка - <i>C. saturatus</i> Blyth.	3	гн.
Отряд СOVOобразные - Strigiformes Семейство Совиные - Strigidae			
160.	Белая сова - <i>Nyctea scandiaca</i> (L.)	-	зим.
161.	Филин - <i>Bubo bubo</i> (L.)	2,3	гн.
162.	Ушастая сова - <i>Asio otus</i> (L.)	-	гн.
163.	Болотная сова - <i>A. flammeus</i> (Pontopp.)	4	гн.
164.	Сплюшка - <i>Otus scops</i> (L.)	3	гн.
165.	Мохноногий сыч - <i>Aegolius funereus</i> (L.)	4	гн.
166.	Домовый сыч - <i>Athene noctua</i> (Scop.)	3	гн.
167.	Воробьиный сыч - <i>Glaucidium passerinum</i> (L.)	4	гн.
168.	Ястребиная сова - <i>Surnia ulula</i> (L.)	3	вер.гн.
169.	Серая неясыть - <i>Strix aluco</i> L.	4	гн.
170.	Длиннохвостая неясыть - <i>S. uralensis</i> Pall.	-	гн.
171.	Бородатая неясыть - <i>S. nebulosa</i> J.R. Forst.	3	гн.
Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes Семейство Козодои -			
172.	Европейский козодой - <i>Caprimulgus europæus</i> L.	-	гн.
Отряд Стрижеобразные - Apodiformes Семейство Стрижиные - Apodidae			
173.	Черный стриж - <i>Apus apus</i> (L.)	-	гн.
Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes			
Семейство Сизоворонковые - Coraciidae			
174.	Сизоворонка - <i>Coracias garrulus</i> L.	3	гн.
Семейство Зимородковые - Alcedinidae			
175.	Обыкновенный зимород - <i>Alcedo atthis</i> (L.)	1 3	[гн.

№	Вид	Степень охраны	Характер пребывания
Семейство Щурковые - Meropidae			
176.	Золотистая щурка - <i>Merops apiaster</i> L.	3	гн.
Семейство Удодовые - Upupidae			
177.	Удод - <i>Upupa epops</i> L.	-	гн.
Отряд Дятлообразные - Piciformes Семейство Дятловые - Picidae			
178.	Вертишейка - <i>Junco hyemalis</i> L.	4	гн.
179.	Зеленый дятел - <i>Picus viridis</i> L.	4	гн.
180.	Седой дятел - <i>P. canus</i> Gm.	3	гн.
181.	Желна - <i>Dryocopus martius</i> (L.)	-	гн.
182.	Большой пестрый дятел - <i>Dendrocopos major</i> (L.)	-	гн.
183.	Белоспинный дятел - <i>D. leucotus</i> (Bechst.)	-	гн.
184.	Малый пестрый дятел - <i>D. minor</i> (L.)	-	гн.
185.	Трехпалый дятел - <i>Picoides trydactylus</i> (L.)	3	гн.
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes			
Семейство Ласточковые - Hirundinidae			
186.	Береговая ласточка - <i>Riparia riparia</i> (L.)	-	гн.
187.	Деревенская ласточка - <i>Hirundo rustica</i> L.	-	гн.
188.	Воронок - <i>Delichon urbica</i> (L.)	-	гн.
Семейство Жаворонковые - Alaudidae			
189.	Хохлатый жаворонок - <i>Galerida cristata</i> (L.)	-	рег. зал.
190.	Рогатый жаворонок - <i>Eremophila alpestris</i> (L.)	-	пр.
191.	Лесной жаворонок - <i>Lullula arborea</i> (L.)	4	гн.
192.	Полевой жаворонок - <i>Alauda arvensis</i> L.	-	гн.
Семейство Трясогузковые - Motacillidae			
193.	Лесной конек - <i>Anthus trivialis</i> (L.)	-	гн.
194.	Луговой конек - <i>A. pratensis</i> (L.)	3	гн.
195.	Краснозобый конек - <i>A. cervinus</i> (Pall.)	-	пр.
196.	Желтая трясогузка - <i>Motacilla flava</i> L.	-	гн.
197.	Желтоголовая трясогузка - <i>M. citreola</i> Pall.	-	гн.
198.	Желтолобая трясогузка - <i>M. lutea</i> Gm.	-	рег. зал.
199.	Белая трясогузка - <i>M. alba</i> L.	-	гн.
Семейство Сорокопутовые - Laniidae			
200.	Обыкновенный жулан - <i>Lanius collurio</i> L.	-	гн.
201.	Чернолобый сорокопут - <i>L. minor</i> Gm.	-	ел. зал.
202.	Серый сорокопут - <i>L. excubitor</i> L.	2,3	гн.
Семейство Иволговые - Oriolidae			
203.	Обыкновенная иволга - <i>Oriolus oriolus</i> (L.)	-	гн.
Семейство Скворцовые - Sturnidae			
204.	Обыкновенный скворец - <i>Sturnus vulgaris</i> L.	-	гн.
Семейство Врановые - Corvidae			
205.	Кукша - <i>Pernis ptilorhynchus</i> (L.)	3	гн.
206.	Сойка - <i>Garrulus glandarius</i> (L.)	-	гн.
207.	Сорока - <i>Pica pica</i> (L.)	-	гн.
208.	Кедровка - <i>Nucifraga caryocatactes</i> (L.)	4	нерег. гн.
209.	Галка - <i>Corvus monedula</i> L.	-	гн.
210.	Грач - <i>C. frugilegus</i> L.	-	гн.
211.	Серая ворона - <i>C. cornix</i> L.	-	гн.
212.	Ворон - <i>C. corax</i> L.	-	гн.
Семейство Свиристелевые - Bombycillidae			
213.	Свиристель - <i>Bombycilla garrulus</i> (L.)	-	зим.
Семейство Оляпковые - Cinclidae			
214.	Оляпка - <i>Cinclus cinclus</i> (L.)	3	рег. зал. (ранее гн.)
Семейство Крапивниковые - Troglodytidae			
215.	Крапивник - <i>Troglodytes troglodytes</i> (L.)	4	гн.

№	Вид	Степень охраны	Характер пребывания
Семейство Завирушковые - Prunellidae			
216.	Лесная завирушка— <i>Prunella modularis</i> (L.)	4	гн.
Семейство Славковые - Sylviidae			
217.	Речной сверчок- <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf.)	-	гн.
218.	Обыкновенный сверчок - <i>L. naevia</i> (Bodd.)	3	гн.
219.	Соловиный сверчок- <i>L. luscinioides</i> (Savi)	-	ел. зал.
220.	Пятнистый сверчок - <i>L. lanceolata</i> (Temm.)	-	ел. зал.
221.	Вертялая камышевка - <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot)	1,2	вер. гн. (пер. зал •)
222.	Камышевка-барсучок- <i>A. schoenobaenus</i> (L.)	-	гн.
223.	Садовая камышевка - <i>A. dumetorum</i> (Blyth.)	-	гн.
224.	Болотная камышевка- <i>A. palustris</i> (Bechst.)	-	гн.
225.	Дроздовидная камышевка- <i>A. arundinaceus</i> (L.)	-	гн.
226.	Индийская камышевка - <i>A. agricola</i> Jerdon	-	пр.
227.	Зеленая пересмешка- <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)	-	гн.
228.	Северная бормотушка - <i>H. caligata</i> (Licht.)	3	гн.
229.	Ястребиная славка - <i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.)	3	гн.
230.	Черноголовая славка - <i>S. atricapilla</i> (L.)	-	гн.
231.	Садовая славка - <i>S. borin</i> (Bodd.)	-	гн.
232.	Серая славка — <i>S. communis</i> Lath.	-	гн.
233.	Славка-завирушка - <i>S. curruca</i> (L.)	-	гн.
234.	Пеночка-весничка- <i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)	-	гн.
235.	Пеночка-теньковка - <i>Ph. collybhus</i> (Vieill.)	-	гн.
236.	Пеночка-трещетка - <i>Ph. sibilatrix</i> (Bechst.)	-	гн.
237.	Зеленая пеночка — <i>Ph. trochiloides</i> (Sund.)	-	гн.
238.	Пеночка-таловка - <i>Ph. borealis</i> (Bias.)	-	пр.
Семейство Корольковые - Regulidae			
239.	Желтоголовый королек- <i>Regulus regulus</i> (L.)	-	гн.
Семейство Мухоловковые — Muscicapidae			
240.	Мухоловка-пеструшка - <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pall.)	-	гн.
241.	Мухоловка-белошейка — <i>F. albicollis</i> Temm.	3	гн.
242.	Малая мухоловка - <i>F. parva</i> Bechst.	-	гн.
243.	Серая мухоловка - <i>Muscicapa striata</i> (Pall.)	-	гн.
Семейство Дроздовые - Turdidae			
244.	Луговой чекан - <i>Saxicola ruberta</i> (L.)	-	гн.
245.	Обыкновенная каменка - <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.)	-	гн.
246.	Обыкновенная горихвостка- <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.)	-	гн.
247.	Горихвостка-чернушка - <i>Ph. ochrurus</i> (Cm)	-	гн.
248.	Зарянка - <i>Erithacus rubecola</i> (L.)	-	гн.
249.	Обыкновенный соловей - <i>Luscinia luscinia</i> (L.)	-	гн.
250.	Варакушка - <i>L. svecica</i> (L.)	-	гн.
251.	Рябинник - <i>Turdus pilaris</i> L.	-	гн.
252.	Черный дрозд- <i>T. merula</i> L.	-	гн.
253.	Белобровик- <i>T. iliacus</i> L.	-	гн.
254.	Певчий дрозд- <i>T. philomelos</i> C.L. Brehm.	-	гн.
255.	Деряба- <i>T. viscivorus</i> L.	-	гн.
Семейство Длиннохвостые синицы - Aeg thalidae			
256.	Длиннохвостая синица- <i>Aegithalos caudatus</i> (L.)	-	гн.
Семейство Синицевые - Paridae			
257.	Обыкновенный ремез- <i>Remizpendulinus</i> (L.)	3	гн.
258.	Буроголовая гаичка- <i>Parus montanus</i> L.	-	гн.
259.	Черноголовая гаичка- <i>Parus palustris</i> L.	-	ел. зал.
260.	Сероголовая гаичка— <i>P. cinctus</i> Bodd.	-	ел. зал.
261.	Хохлатая синица - <i>P. cristatus</i> L.	-	гн.
262.	Московка — <i>P. ater</i> L.	4	гн.

№	Вид	Степень охраны	Характер пребывания
263.	Обыкновенная лазоревка- <i>P. caeruleus</i> L.	-	гн.
264.	Белая лазоревка - <i>P. cyanus</i> Pall.	2,3	гн.
265.	Большая синица - <i>P. major</i> L.	-	гн.
Семейство Поползневые - Sittidae			
266.	Обыкновенный поползень- <i>Sitta europaea</i> L.	-	гн.
Семейство Пищуховые - Certhiidae			
267.	Обыкновенная пищуха - <i>Certhia familiaris</i> L.	-	гн.
Семейство Ткачиковые - Ploceidae			
268.	Домовый воробей - <i>Passer domesticus</i> (L.)	-	гн.
269.	Полевой воробей - <i>P. montanus</i> (L.)	-	гн.
Семейство Вьюрковые - Fringillidae			
270.	Зяблик- <i>Fringilla coelebs</i> L.	-	гн.
271.	Вьюрок - <i>F. montifringilla</i> L.	-	гн.
272.	Обыкновенная зеленушка - <i>Chloris chloris</i> (L.)	-	гн.
273.	Чиж- <i>Spinus spinus</i> (L.)	-	гн.
274.	Черноголовый щегол - <i>Carduelis carduelis</i> (L.)	-	гн.
275.	Коноплянка - <i>Acanthis cannabina</i> (L.)	-	гн.
276.	Обыкновенная чечетка - <i>A. flammea</i> (L.)	3	нерег. гн.
277.	Пепельная чечетка - <i>A. hornemanni</i> (Holb.)	-	зим.
278.	Обыкновенная чечевица- <i>Caprodacus erythrinus</i> (Pall.)	-	гн.
279.	Канареечный вьюрок- <i>Serinus serinus</i> (L.)	-	ел. зал.
280.	Щур - <i>Pinicola enucleator</i> (L.)	-	зим.
281.	Клест-сосновик- <i>Loxia pyropsittacus</i> Borkh.	-	нерег. зим.
282.	Обыкновенный клест- <i>L. curvirostra</i> L.	-	гн.
283.	Белокрылый клест- <i>L. leucoptera</i> Gm.	-	нерег. зим.
284.	Обыкновенный снегирь - <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L.)	-	гн.
285.	Урагус - <i>Uragus sibiricus</i> (Pall.)	-	ел. зал.
286.	Обыкновенный дубонос - <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L.)	4	гн.
Семейство Овсянковые - Emberizidae			
287.	Обыкновенная овсянка- <i>Emberiza citrinella</i> L.	-	гн.
288.	Камышевая овсянка - <i>E. schoeniculus</i> (L.)	-	гн.
289.	Овсянка-ремез - <i>E. rustica</i> Pall.	4	гн.
290.	Дубровник- <i>E. aureola</i> Pall.	4	гн.
291.	Садовая овсянка - <i>E. hortulana</i> L.	4	гн.
292.	Подорожник- <i>Calcarius lapponicus</i> (L.)	-	ел. зал.
293.	Пуночка- <i>Plectrophenax nivalis</i> (L.)	-	зим.

Обозначения:

Степень охраны:


1- вид занесен в Красную книгу МСОП; 2 - вид занесен в Красную книгу России; 3 - вид занесен в Красную книгу Нижегородской области; 4 - вид занесен в Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области; — статуса охраны не имеет.

Статус:

гн. - гнездится, нерег. гн. — нерегулярно гнездится, пр. - встречается на пролете, нерег. пр.- нерегулярно на пролете; зим. - встречается зимой, лет. - встречается летом, но не гнездится,, рег. зал. - отмечены рег. залеты; ел. зал - отмечены единичные случайные залеты

Виды птиц, находящиеся в Нижегородской области под наибольшей угрозой исчезновения

1. Чернозобая гагара (фактор беспокойства, изменение водоемов в результате антропогенного воздействия, возможно - климатические изменения)
2. Черный аист (вырубка высоковозрастных лесов, фактор беспокойства, браконьерство)
3. Беркут (рубки леса, осушение болот, прямое преследование, фактор беспокойства)
4. Могильник (рубки леса, отсутствие подходящих местообитаний, фактор беспокойства)
5. Большой подорлик (вырубка лесов, мелиорация пойм и болот, фактор беспокойства, браконьерство)
6. Орел-карлик (вырубка высоковозрастных лесов)
7. Змееяд (рубки леса, подрыв кормовой базы, фактор беспокойства)
8. Орлан-белохвост (рубка леса, браконьерский отстрел, беспокойство)
9. Скопа (вырубка пригодных для гнездования деревьев, истощение кормовой базы в результате загрязнения водоемов, беспокойство)
10. Степной лунь (распашка степей, перевыпас скота, выжигание травянистой растительности)
11. Сапсан (вырубка высоковозрастных лесов, мелиорация болот, торфоразработки, фактор беспокойства)
12. Дербник (вырубка высоковозрастных болот, мелиорация болот, торфоразработки)
13. Белая куропатка (осушение крупных массивов верховых болот, возможно, климатические изменения).
14. Филин (рубки леса, беспокойство, браконьерство)
15. Бородатая неясыть (рубки леса, браконьерство)
16. Кукша (вырубка высоковозрастных хвойных лесов)



СОЮЗ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ
Программа "Ключевые орнитологические территории России"

КАРТОЧКА МОНИТОРИНГА КОТР в 1200 г.1

(просьба выслать в Координационный центр СОПР до
1 февраля следующего за отчетным года)

Российский | Субъект Федерации:
код КОТР:

Заполненную карточку просим отправить по
адресу: 111123 Москва, шоссе Энтузиастов,
60, корп. 1, Союз охраны птиц России

Название КОТР:

Географические координаты
центра территории:

с.ш.

в.д.

Проводившиеся на территории в текущем году научные и природоохранные программы (проекты), в том числе осуществляемые не Союзом охраны птиц России:

Кампании, акции и т.п. по сохранению данной территории.

А) Проводившиеся в текущем году:

Б) Необходимые в ближайшем будущем (поясните, почему они необходимы):

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО СТАТУСА ТЕРРИТОРИИ

Приводится информация о создании новых или ликвидации/сокращении/расширении/изменении статуса существовавших в пределах КОТР ООПТ, о внесении КОТР в списки ценных территорий (Рамсарские ВБУ, участки Всемирного природного наследия и т.п.), о резервировании территорий для природоохранных целей, о включении их в официально утвержденные региональные схемы экосетей и т.п. Описание ООПТ дается по прилагаемой ниже форме. Другая информация приводится в произвольном виде в графе "Дополнительные замечания" или на отдельном листе.

Название ООПТ:

Статус (заповедник, заказник и
т.п.):

Год образования ООПТ:

Географические координаты центра ООПТ:

Общая площадь ООПТ (га):

Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР (га):

Дополнительные замечания:

УГРОЗА ДЕГРАДАЦИИ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК КОТР

Тип угрозы	Степень угрозы	
	Предыдущая оценка*	Оценка в текущем году
сведение лесов		
интенсивное лесное хозяйство		
выборочная рубка леса		
рубка леса на дрова и сбор сушняка местным населением		
сплошная рубка леса		
посадка леса или залесение территории		
осушительная мелиорация		
затопление территории		
строительство дамб		
забор подземных вод		
выпас скота в лесу		
интенсивное с/х-о (удобрения, гербициды, деградация местообитаний)		
перевыпас скота		
уничтожение и сокращение пастбищ		
сокращение с/хозяйственных площадей		
сенокошение		
развитие инфраструктуры территории		
строительство населенных пунктов		
индустриальное строительство		
торфоразработка		
добыча других полезных ископаемых		
дачное строительство, садово-огородные участки		
аквакультура/рыболовный промысел		
перепромысел хозяйственно важных видов		
весенняя охота		
браконьерство		
рекреационная нагрузка		
фактор беспокойства		
конкуренция с интродуцированными видами		
естественные природные причины (эрозия и т.п.)		
другое:		

* См. карточку описания КОТР или Каталог КОТР Европейской России (для включенных в него территорий международного значения). В случае, если угроза в текущем году установлена впервые, в данной графе ставится "-".

Бальная оценка степени угрозы деградации КОТР:

1а) Негативное влияние на местообитания:

- полное уничтожение местообитания (3)
- быстрое разрушение местообитания (2)
- относительно медленное разрушение местообитания (1)

1б) Негативное влияние на виды (в баллах):

- сказывается на большинстве глобально редких видов (3)
- сказывается на части глобально редких видов (2)
- сказывается на видах других категорий уязвимости (1)

2) Масштаб негативных изменений:

- вся территория КОТР (3)
- большая часть территории КОТР, но не наиболее критическая для существования глобально редких видов (2)
- небольшая часть территории КОТР, не являющаяся критической для глобально редких видов (1)

3) Насколько скоро может осуществиться преобразование территории:

- уже осуществляется (3)
- изменения планируются и осуществляются в ближайшем будущем (2)
- изменения планируются в отдаленном будущем (1)

Определение степени угрозы (суммарная оценка):

A - высокая (8-9 баллов); **B** - средняя (6-7 баллов); **C** - низкая (до 5 баллов); **D** - неизвестно.

Как Вы в целом оцениваете состояние КОТР (подчеркните **одно** из значений):
© - состояние КОТР улучшилось, © - состояние стабильно (без улучшения, но и без ухудшения),
© - состояние КОТР ухудшилось, © ! - сильное ухудшение.

Причины ухудшения или улучшения ситуации. Ваши рекомендации о необходимых ответных мерах. Какая помощь нужна от координационного центра программы КОТР и руководства СОПР:

Другая имеющаяся у Вас информация об изменениях ситуации в пределах КОТР (изменения Форм собственности на землю, хозяйственного использования территории, ее биотопической структуры и т.п.):

Орнитологический мониторинг в 200 г.

Численность в гнездовой сезон (R, B, B?) приводится в парах, остальное - в особях. **Это важно:** По умолчанию - оценка численности дается для всей территории КОТР; если же численность приводится только для какой-то части КОТР, то **обязательно** необходимо это отметить, указав район обследования и его площадь.

[illegible]

(Продолжение таблицы можно приложить на отдельном листе)

Характер пребывания вида (ХП): R - оседлые гнездящиеся (встречаются круглый год); B - перелетные гнездящиеся (встречаются в гнездовое время); B? - гнездование вида предполагается; N - летующие (встречаются в гнездовой период, но не гнездятся); P - пролетные (встречаются во время миграций), в т.ч.: Ps - встречающиеся на весеннем пролете, Pf - встречающиеся на осеннем пролете; W - зимующие; Vn - кочующие; V - залетные; U - характер пребывания неизвестен.

Это важно: в случае пролетных видов **обязательно** укажите в колонке "Примечание", какую численность Вы приводите: суммарную численность за весь период пролета или единовременную численность скоплений; по возможности, желательно приводить оба эти показателя.

Точность оценки: А - достоверная, В - неполная, С - слабая, U - неизвестно.

Кратко опишите район и сроки работ, а также методику учетов и способ экстраполяции учетных данных:

Карта КОТР (обязательно укажите ее масштаб) (карту можно приложить на отдельном листе) с нанесением всех произошедших изменений (границы новых ООПТ; районы негативных изменений и т.п.):

Составитель (Ф.И.О., адрес):

Дата заполнения:

Приложения:

1. Если использовались данные местных наблюдателей ("хранителей"), сообщите их полные Ф.И.О. и адрес (на отдельном листе) для включения в список рассылки информационно-методических материалов по программе КОТР и подготовки благодарственных писем.
2. Список публикаций о КОТР в текущем году (**в т.ч. в местной прессе**) (пришлите, пожалуйста, для библиотеки Союза копии этих публикаций):

Оглавление

Введение	3
Краткая характеристика Нижегородской области	3
Орнитологическая значимость Нижегородской области	3
Состояние охраны птиц	4
Программа «Ключевые орнитологические территории России»	5
Организация общественной поддержки ключевых орнитологических территорий (КОТР) в Нижегородской области	5
Критерии выделения КОТР	9
Ключевые орнитологические территории Нижегородской области	16
1. Пойма р. Ветлуги и примыкающие массивы лесов и болот	16
2. Массив лесов и болот в низовьях р. Б. Какша	17
3. Участки высоковозрастных хвойных лесов и болот в низовьях р. Б.Вахтан	18
4. Пижемский заказник	19
5. Одошнурский пруд	21
6. Участки пойм р. Ошма и р. Пижма на северо-востоке Тоншаевского района и территория предотлетного скопления серых журавлей	21
7. Унженский отрог Горьковского водохранилища и примыкающие территории	22
8. Массив лесов и болот в истоках рек Керженец, Лапшанга, Черный Лух	24
9. Лесной массив по р.р. Шада и Аграфенка	25
10. Варнавинский заказник	25
11. Массив верховых и переходных болот в Краснобаковском районе	26
12. Поймы рек Уста и Вая	26
13. Массив высоковозрастных южнотаежных лесов по р. Ижма	27
14. Массив лесов и болот в Красноярском лесничестве Воскресенского лесхоза и территория предотлетного скопления серых журавлей у с. Попово и Черново	28
15. Килемарский заказник (НГ-006)	29
16. Водоем с колонией озерных чаек в с. Заболотное	31
17. Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики	31
18. Массив сосновых лесов в Бриляковском лесничестве	32
19. Массивы верховых и переходных болот в среднем течении р. Керженец	32
20. Территория между д. Ковригино и г. Городец	33
21. Чашковское болото	34
22. Русло и пойма р. Волги от г. Городец до г. Н.Новгород	35
23. Зиняковские пруды	36
24. Видуновское болото	37
25. Ситниковские торфокарьеры (НГ-002) RU185	37
26. Пойма и русло р. Волги от г. Н.Новгорода до п. Память Парижской Коммуны	39
27. Болотный массив в правобережье среднего течения р. Керженец	40
28. Массив лесов и болот по р. Нюжма и примыкающий участок поймы р. Волги	40
29. Камско-Бакалдинские болота (НГ-001) RU184	41
30. Сурской отрог Чебоксарского водохранилища и примыкающий участок поймы р.р. Волга и Сура	44
31. Система болот и торфокарьеров у р.п. Фролищи и р.п. Чистое	45
32. Торфокарьеры Володарского и Балахнинского районов (НГ-007)	46
33. Водоем в р.п. Красная Горка	47
34. Пойма р. Оки от устья Клязьмы до г. Дзержинск	47
35. Система водоемов около р.п. Бабино	48
36. Водоем с колонией чаек около пос. Строителей	49
37. Массив верховых и переходных болот в Павловском Заочье и примыкающий участок поймы р. Оки	50
38. Озеро Ворсменское	51
39. Пруд в с. Шелокша	52
40. Долина реки Шава, включая пруды рыбхоза «Борок»	52
41. Пойма р. Оки в Вачском районе и примыкающие территории Владимирской области	53
42. Пруды Борцовского рыбхоза	54
43. Сосново-можжевельниковый остепненный массив	54
44. Долина верховьев р. Озерки	55
45. Долина р. Урга у с. Низовка	55
46. Территория предотлетного скопления журавлей у с. Русское Маклаково	56

47. Поймы рек Урга и Урынга между с.с. Покров Майдан и Антоново.	56
48. Курмышская пойма.	57
49. Пойма р. Оки в Навашином районе.	58
50. Торфокарьеры около разъезда Мезино.	59
51. Массив лесов и болот около устья р. Серези.	60
52. Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении р. Серези (НГ-003).	60
53. Массив лесов и болот в Степуринском и Тешинском лесничествах.	62
54. Государственный природный комплексный заказник «Мухтоловский».	63
55. Территория Личадеевского предотлетного скопления журавлей.	64
56. Озеро Вадское.	64
57. Чайкино болото.	65
58. Ичалковский бор (НГ-004).	66
59. Пойма р. Пьяны в Бутурлинском и Сергачском районах.	67
60. Черноольховое болото с колонией цапель в пойме р. Пьяны около г. Сергач.	68
61. Болото «Мшаниха» в г. Сергач.	68
62. Овражно-балочные системы Центрального Межпьянья.	69
63. Шумерлинская (НГ-008).	70
64. Пойма р. Пьяна около с. Сарга.	71
65. Пойма р. Оки в Выксунском районе.	72
66. Водоемы с колонией чайковых около д. Тамболес.	73
67. Водоемы с колониями чайковых около г. Выкса.	73
68. Велетьминский пруд.	74
69. Массив лесов и болот в Семиловском лесничестве и примыкающие территории.	75
70. Пруды Полдеревского рыбхоза.	75
71. Пруды Илевского рыбхоза.	76
72. Пойма р. Мокша и территория предотлетного скопления серых журавлей около п. Хохлиха и п. Шаприха.	77
73. Урочище «Скит» и прилегающий лесной массив.	78
74. Леса в истоке р. Алатырь.	78
75. КОТР «Разинская».	78
76. Дубрава Коммунарского лесничества.	79
77. Пойма р. Рудая и примыкающие территории.	79
Вероятно областные КОТР.	81
Приложение 1. Список орнитофауны Нижегородской области.	82
Приложение 2. Виды птиц, находящиеся в Нижегородской области под наибольшей угрозой исчезновения.	89
Приложение 3. Карточка мониторинга КОТР.	90



Нижегородская область известна в стране инновационными подходами к проблемам охраны живой природы. Она стала первым регионом России, где были разработаны, утверждены как нормативные документы и успешно реализуются Стратегия и План действий по сохранению биоразнообразия.

Издание каталога ключевых орнитологических территорий - важный этап подведения итогов их инвентаризации в Нижегородской области и инструмент дальнейшего развития деятельности по сохранению биоразнообразия.

Изучение и сохранение ключевых орнитологических территорий - важная инициатива, обеспечивающая успешное социальное партнерство в процессе устойчивого развития региона. В области развернуты широкомасштабные действия по организации общественной поддержки ключевых орнитологических территорий.

Умение находить взаимопонимание с общественными и государственными организациями, вовлекать в природоохранное движение все новых энтузиастов, сотрудничество с областной администрацией и финансовая поддержка областного экологического фонда - все это весомые составляющие успешной деятельности Нижегородского отделения Союза охраны птиц России.

Уже свыше 60 % ключевых орнитологических территорий области полностью или частично обеспечены территориальной охраной. Надеюсь, что эта книга будет способствовать сохранению удивительно богатой природы Нижегородского Поволжья.

Н.Г. Соколов,
Руководитель Комитета охраны природы
и управления природопользованием
Нижегородской области



В 2004 году Союз охраны птиц России отметил десятилетие работы по программе «Ключевые орнитологические территории России» (сокращенно - КОТР). Эта программа - часть огромного труда, который выполняют любители птиц во всем мире под эгидой международной ассоциации охраны птиц BirdLife International. Главная ее задача - выявить и сохранить все территории, которые играют важнейшую роль в жизни птиц. В первую очередь такие, где обитают виды, находящиеся под глобальной угрозой исчезновения, или места обитания птиц, ответственные за судьбу целых видов. Для того, чтобы охранять, нужно знать, чем мы владеем. BirdLife издает каталоги с территориями международного ранга, координационный центр в Москве работает над каталогами КОТР общероссийского значения. Информации о региональных ключевых орнитологических территориях (а число их

огромно) в них нет. И тиражи не так велики, чтобы книги были доступны всем, кто в них нуждается. Каталог, который Вы держите в руках, должен разрешить эти проблемы. Это - региональный сборник, один из первых в России. Для того, чтобы он получился, потребовалось несколько лет экспедиций, учетов птиц и кропотливой работы по составлению описаний. В нем - результаты труда сотен энтузиастов. Мы уверены, что вложенные в него знания помогут спланировать работу по охране птиц и мест их обитания.

Нижегородская область относится к числу лидеров в реализации программы «Ключевые орнитологические территории России», а нижегородский опыт организации общественной поддержки КОТР с интересом изучается не только в нашей стране, но и за рубежом.

Е.Д. Краснова,
координатор программы
«Ключевые орнитологические территории России»

Ключевые орнитологические
территории **РОССИИ**





Формат 60x84 1/8.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 4,85. Заказ № 545. Тираж 500 экз.

Типография Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.

Лиц. ПД № 18-0099 от 4.05.01.

603000, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 37